



Bavistin® FL

Bavistin® FL

Vsebuje: 500 g/L + 5% karbendazim, (metil benzimidazol-2-ilkarbamat), (dovoljena DAP in HAP do 3,5 mg/kg), CAS št.: 10605-21-7

Koncentrirana suspenzija (SC)

Bavistin FL je sistemsko delujoč fungicid za zatiranje boleznih pšenice in sladkorne pese.

Lahko povzroči dedne genske okvare.

Lahko škoduje plodnosti.

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

Zelo strupeno za vodne organizme; lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Hraniti zaklenjeno.

Hraniti izven dosega otrok.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Med uporabo ne jesti, piti in ne kaditi.

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in etiketo. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

Proizvaja:
BASF
Aktiengesellschaft
D-67056
Ludwigshafen
Nemčija

Zastopa:
BASF SLOV d.o.o.
Dunajska 111a
1000 Ljubljana

Prodaja:
Metrob d.o.o.
Začet 20a
3202 Ljubecna
Tel.: 03 78 06 330

Vsebina: **1 liter**

T



Strupeno

N



Okolju nevarno

SKLADIŠČENJE:

Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem prostoru, pri temperaturah -5 do +40 °C, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, ločeno od živil in krmil.

Dovoljenje za promet: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarna uprava RS, št.: SFS 7045 od 21.03.1997 in št.: 327-02-192/2004/2.

Štev. šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži.

Rok uporabe: 2 leti pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži.

Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca.

Ne uporabljajte prazne embalaže!

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodilo za uporabo.



® = zaščitni znak firme BASF

81024486SI011206-Slovenia

NAMEN IN NAČIN UPORABE:

Bavistin® FL je sistemično delujoč fungicid za zatiranje boleznih pšenice in sladkorne pese. Uporablja se v odmerku 0,3 do 0,5 L/ha. V odvisnosti od pojava bolezni sta potrebni eno do tri škropljenja.

NAČIN DELOVANJA:

Aktivna snov karbendazim učinkuje kot sistemično, kurativno in preventivno delujoči BMC. Razkraja celično strukturo gliv in preprečuje celično delitev (posledično rast in razvoj).

UPORABA:

Bavistin FL je fungicid za zatiranje:

a) na pšenici

- **črne žitne noge** (*Gaeumannomyces graminis*) v odmerku 0,3–0,4 L/ha ob porabi vode 200–400 L/ha (3–4 ml na 2–4 L vode na 100 m²), tretiramo samo enkrat v času razraščanja;
- **rjavenje pšeničnih plev** (*Stagonospora nodorum*) v odmerku 0,3 L/ha ob porabi vode 200–400 L/ha (3 ml v 2–4 L vode na 100 m²), tretiramo v času klastenja ali najkasneje v času cvetenja,

b) **pesne listne pegavosti na sladkorni pesi** (*Cercospora beticola*) v odmerku 0,5 L/ha.

OPOZORILA:

Bavistin FL lahko na pšenici uporabimo največ dvakrat v rastni sezoni na isti površini, na sladkorni pesi pa trikrat.

KARENCA: 42 dni za pšenico in sladkorno peso.

FITOTOKSIČNOST:

Sredstvo, uporabljeno v priporočenih količinah, na pravilen način in v primernem času, ni fitotoksično. To navodilo se nanaša na poznane sorte navedenih kultur. Za nove, redke in hibridne sorte je priporočljivo narediti test fitotoksičnosti.

NEVARNE LASTNOSTI:

Bavistin® FL je strupen za ljudi, ribe in toplokrvne živali, ni pa škodljiv za čebele.

ZNAKI ZASTRUPITVE

Znaki zastrupitve so nespecifični. Pričakujemo jih lahko predvsem v primeru zaužitja večje količine nerazredčenega pripravka ter vdihavanju par.

PRVA POMOČ PRI ZASTRUPITVI

Splošni ukrepi:

Prizadeto osebo umakniti iz kontaminiranega območja na svež zrak oz. v dobro zračen prostor in jo zavarovati pred mrazom. Zagotoviti osnovne življenjske funkcije. Takoj poklicati zdravnika in mu pokazati originalno navodilo o uporabi in/ali embalažo pripravka.

Stik s kožo:

Odstraniti kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umiti z vodo in milom.

Stik z očmi:

če pride sredstvo v oči, jih temeljito izprati s čisto vodo in poiskati pomoč očesnega zdravnika.

Pri inhalaciji:

Zagotoviti osnovne življenjske funkcije in ukrepati po splošnih navodilih.

Pri zaužitju:

Usta takoj temeljito speremo z vodo. Prizadeti naj popije 2–3 dl vode.

Takoj poklicati zdravnika in mu pokazati originalno navodilo o uporabi in/ali embalažo.

Oseba z moteno zavestjo ne sme ničesar piti!

NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ

Zagotoviti in vzdrževati je potrebno vitalne funkcije. Pri zaužitju sredstva dati prisebni osebi aktivno oglje 1 g/kg telesne teže razredčenega z vodo v razmerju 1 : 4.

V primeru zaužitja velike količine sredstva je indicirano tudi izpiranje želodca. Specifičnega antidota ni.

NADALJEVANJE ZDRAVLJENJA

Zdravljenje je simptomatično.

PREVENTIVNI IN ZAŠČITNI UKREPI

Shranjevanje

Pripravek shranjevati v originalni, dobro zaprti embalaži, v zračnem, suhem in zaklenjenem prostoru, zaščiten pred svetlobo in viri toplote. Temperatura ne sme biti nižja od –5 °C in višja od +40 °C, ločeno od živil in krmil, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

Zaščita pri delu

Pri delu pazite, da pripravek ne pride v oči, na kožo in obleko. Pri pripravi in uporabi škropiva nositi zaščitno obleko, škornje in rokavice ter zaščitna očala. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. V primeru kontaminacije in/ali suma na zastrupitev prekiniti z delom in ukrepati po navodilu prve pomoči.

Po delu se umijte oziroma stuširajte. Operite in očistite vsa uporabljena zaščitna sredstva. Prav tako skrbno očistite opremo za škropljenje z vodno raztopino detergenta.

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

Pripravek je strupen za vodne organizme, zato je potrebno preprečiti onesnaževanje tekočih in stoječih voda. Mesto škropljenja mora biti oddaljeno najmanj 20 m od voda. Sredstvo, njegove ostanke ter prazne embalaže ne puščati v bližini voda.

DRUGI UKREPI

Ravnanje z embalažo

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstvo, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki.

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izpramo (velja za plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadke, skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. tako očiščeno embalažo brezplačno prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesemo na mesto kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

V primeru razlitja

je potrebno takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno opremo in obvestiti pooblaščen osebe. Preprečiti izlivanje v kanalizacijo, vodotoke in vpijanje v tla.

Poškodovano originalno embalažo spraviti v posebej označeno večjo embalažo. Absorbirano sredstvo zbrati v ustrezne in posebej označene posode in jih oddati v zbirnik posebnih odpadkov pri uvozniku: Metrob d.o.o., Kidričeva 36, 3000 Celje ali pa pri pooblaščenem podjetju za uničevanje nevarnih industrijskih odpadkov.

V primeru požara

je potrebno takoj uporabiti naslednjo zaščito: dihalni aparat s filtrom P2 (za trdne in tekoče delce), na kemikalije odporno varovalno obleko, varovalna očala. Za gašenje uporabljamo: razpršeno vodo, peno, suha sredstva za gašenje in CO₂. Pri gorenju lahko nastajajo: ogljikov monoksid in dušikovi oksidi.

V primeru nesreče med prevozom

Je potrebno takoj ugasniti motor vozila in pogasiti morebiten odprti ogenj. Zavarujte mesto dogodka in opozorite ostale udeležence v prometu. Preprečite širjenje tekočine po okolici s posipanjem snovi, ki vpija in izdelavo okopov. Obvestite najbližjo postajo policije, oziroma gasilce ali Center za obveščanje št. 112. Nadaljnje ukrepanje je potrebno po navodilih za primere razlitja. Etiketa je takšna kot jo je odobril pristojni organ.

TEHNIKA UPORABE SREDSTVA:

Preprečevanje nastajanja ostankov:

Ne pripravljamo večjih količin škropiva kot je potrebno. Embalažo izpraznimo do konca, speremo z vodo in to dodamo škropivu v rezervoarju! Slučajno nastale ostanke škropiva razredčimo v razmerju 1:10 in poškopimo po tretirani površini.

Tretiranje:

Škropilnice redno testiramo!

Pred pričetkom tretiranja škropilnico umerimo in preverimo izmet šob. Med vožnjo in tretiranjem škropivo stalno mešamo ustrezno tipu škropilnice. Še posebej je mešanje potrebno po prekinitvi dela.

Priporočena poraba vode: poljedelstvo: 200–400 l/ha.

Priprava sredstva za uporabo:

Razervoar škropilnice napolnimo do tretjine z vodo ter med mešanjem dodamo odmerjeno količino sredstva. Dopolnimo z vodo do polnega volumna.

Mešanje:

Bavistin FL lahko mešamo z ostalimi, običajno uporabljenimi fungicidi in herbicidi. Insekticide (Perfektion®) ter foliarna gnojila je škropilni mešanici priporočljivo dodajati tik pred uporabo. Ne meša se z alkalnimi pripravki kot so bazičen bakrov sulfat, bordojska brozga in žvepleno apnena brozga.

Čiščenje:

Škropilnico in uporabljeno posodo takoj po uporabi oprati z veliko vode, še bolje z dodatkom sredstva za pranje in splakniti z vodo.

Klavzula o jamstvu

Raziskave so pokazale, da je proizvod primeren za uporabo, pri čemer je potrebno upoštevati navodila o uporabi. Ker na uporabo in shranjevanje ne moremo vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti vseh okoliščin, ki vplivajo na pripravek, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica nepravilne uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost proizvoda, medtem ko za rizik pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo.

Bavistin® FL

Vsebuje: 500 g/L + 5% karbendazim,
(metil benzimidazol-
2-ilkarbamat), (dovoljena DAP in HAP do
3,5 mg/kg), CAS št.: 10605-21-7

Koncentrirana suspenzija (SC)

Bavistin FL je sistemsko delujoč fungicid za zatiranje boleznih pšenice in sladkorne pese.

Lahko povzroči dedne genske okvare.

Lahko škoduje plodnosti.

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

Zelo strupeno za vodne organizme; lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Hraniti zaklenjeno.

Hraniti izven dosega otrok.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Med uporabo ne jesti, piti in ne kaditi.

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in etiketo. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

Proizvaja:
BASF
Aktiengesellschaft
D-67056
Ludwigshafen
Nemčija

Zastopa:
BASF SLOV d.o.o.
Dunajska 111a
1000 Ljubljana

Prodaja:
Metrob d.o.o.
Začet 20a
3202 Ljubecna
Tel.: 03 78 06 330

Vsebina: **1 liter**

T



Strupeno

N



Okolju nevarno

SKLADIŠČENJE:

Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem prostoru, pri temperaturah -5 do +40 °C, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, ločeno od živil in krmil.

Dovoljenje za promet: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarna uprava RS, št.: SFS 7045 od 21.03.1997 in št.: 327-02-192/2004/2.

Štev. šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži.

Rok uporabe: 2 leti pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži.

Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca.

Ne uporabljajte prazne embalaže!

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodilo za uporabo.

