

BASF

The Chemical Company

Polyram® DF

Polyram® DF, Vsebuje: 70 % METIRAM
(tris(amincink-etilen-bis(ditiokarbamat)-tetra-hidro-
1,2,4,7-ditiadiazocin-3,8-dition, polimer),

Močljiva zrnca (DF),

Polyram® DF je preventiven fungicid, namenjen
zatiranju boleznj jablan, hrušk in češpelj, vinske trte,
hmelja, zelenjave, okrasnih rastlin in sončnic.

V stiku s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

Hraniti zunaj dosega otrok.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Pri ravnanju ne jesti, piti in ne kaditi.

Preprečiti stik s kožo.

Strupen za ljudi, ribe in toplokrvne živali.

Proizvaja:

BASF

Aktiengesellschaft

D-6700 Ludwigshafen

Nemčija

Zastopa:

BASF

Slovenija d.o.o.

Dunajska 111a

1000 Ljubljana



dražilno

Prodaja:

Metrob d.o.o.

Začret 20a

3202 Ljubecna

Tel.: 03 78 06 330

Vsebina: 1 kg



4 014348 613262

Polyram® DF

NAČIN DELOVANJA: Polyram® DF je preventivni fungicid, namenjen zatiranju nekaterih boleznih jabolčan, hrušk in češpelj, vinske trte, hmelja, zelenjave, okrasnih rastlin in sončnic.

NAVODILO ZA UPORABO: Uporablja se za preprečevanje naslednjih rastlinskih bolezni:

- peronospore vinske trte (*Plasmopara viticola*) in rdečega listnega ožiga (Pseudopeziza tracheiphila) v konc. 0,24% (24 g/10 l vode) s pričetkom škropljenja ob pojavu 5.–6. lista;
- črne pegavosti vinske trte (*Phomopsis viticola*) v konc. 0,3 (30 g/10 l vode) oz. 2,4 kg/ha pričetek škropljenja v fenofazi D po Baggioliniju (zgodnji brst) in eno do dvema ponovitvama v razmiku 10 dni;
- na pečkarjih za zatiranje jabolčevega škrlupa (*Venturia inaequalis*) in hruševega škrlupa (*Venturia pirina*) v konc. 0,2% (20 g/10 l vode). Tretiramo od začetka pojava bolezni s ponovitvami na 6 - 10 dni (odvisno od vremenskih razmer);
- na slivah in češpljah za zatiranje češpljeve rje (*Tranzschelia prunispinosae*) v konc. 0,2% (20 g/10 l vode). Tretiramo od začetka pojava bolezni s ponovitvami na 10 - 14 dni;
- solatne plesni (*Bremia lactucae*) z odmerkom 1,2 kg/ha, od začetka pojava bolezni do vorbe glav, s ponovitvami v razmiku 10–14 dni;
- krompirjeve in paradižnikove plesni (*Phytophthora infestans*) v količini 1,5 do 2 kg/ha (15–20 g/100 m²) za krompir ter 1,5 do 3 kg/ha (15–30 g/100 m²) za paradižnik;
- črne pegavosti paradižnika in krompirja (*Alternaria solani*) v količini 2,0 kg/ha (20 g/100 m²);
- belušev rje (*Puccinia asparagi*) v količini 1,2 kg/ha (12 g/100 m²), tretiramo mlade nasade kjer pridelka še ne pobiramo, druge nasade tretiramo po obiranju pridelka;
- plesni (*Peronospora* spp.) in rje (*Puccinia* spp.) okrasnih rastlin na prostem in v rastlinjakih, v 0,2% – koncentraciji (20 g/10 l vode), s škropljenji od začetka pojava bolezni in ponovitvami na 10–14 dni;
- sive (*Diaporthe helianthi*) in črne pegavosti (*Phoma oleracea* var. *helianthi*) sončnic v količini 2,0 kg/ha (20 g/100 m²), s tretiranjem v fazi razvoja 4 do 8 listov in porabi vode 800 do 1000 l/ha (8–10 l/100 m²), največ dvakrat v enem letu.

Ukrepi za varovanje okolja: Pri uporabi pripravka se moramo ravnati po navodilu za uporabo pripravka. Pripravek je strupen za vodne organizme. Pri delu pazimo, da ne onesažimo tekočih in stoječih voda. Mesto škropljenja mora biti oddaljeno najmanj 20 m od vode.

Fitotoksičnost: Sredstvo uporabljeno v priporočenih količinah, na pravilen način ter v optimalnem času ni fitotoksično pri običajnih sortah navedenih kultur. Pri novih, redkih ali hibridnih sortah je zato priporočljivo izvesti test občutljivosti rastlin v danih razmerah pred aplikacijo na večjih površinah. Čas, potreben za podajanje ocene je 10 do 12 dni po škropljenju.

Posebno pozornost sortni občutljivosti je potrebno posvetiti hruškam (ne sme se uporabljati na sorti konferans).

Polyram® DF

Mešanje: Polyram® DF smemo mešati z drugimi fungicidi in insekticidi v praškasti ali granulirani formulaciji. Pripravka ne smemo mešati s kislimi insekticidi in EC insekticidi z vsebnostjo aktivne snovi več kot 35–40% ter foliarnimi gnojili, ki vsebujejo bor. Mešanice uporabimo čimprej.

Karenca: 14 dni za krompir in paradižnik (na odprtem in v rastlinjakih), 21 dni za glavnatu solato, 28 dni za jabolane, hruške, česplje in namizne sorte grozdja, 35 dni za hmelj, 42 dni za vinske sorte grozdja karenca za beluše je zagotovljena s časom uporabe sredstva.

Nevarne lastnosti: Polyram® DF je strupen za ljudi, ribe in toplotne živali. V predpisani količini ni škodljiv za čebele.

Prva pomoč: Splošno priporočilo: Kontaminirano oblačilo slečemo, umivanje z vodo in milom.

Inhalacija: Mirovanje, svež zrak, zdravniška pomoč. Kontakt s kožo: Takojšnje spiranje z vodo in milom. Kontakt z očmi: Oči z razprtimi vekami takoj vsaj 15 minut spiraj s tekočo vodo, obisk zdravnika. Zaužitje: Usta takoj speremo in nato spijemo večjo količino vode, pomoč zdravnika.

Napotek zdravniku: Potrebno je simptomatsko zdravljenje (dekontaminacija, vzdrževanje vitalnih funkcij), specifičen protistrup ni poznan.

Ukrepi v primeru nezgode:

- **Razsutje:** Osebna varovalna sredstva: rokavice, škornji, varovalna obleka. Razsuto sredstvo kolikor se da, pobereмо v posebne kontejnerje. Pri delu preprečujemo prašenje, dospetje v kanalizacijo, zemljo in vodotoke. Pomagamo si s sredstvom, ki veže prah. V zaprtih prostorih površino nato dobro speremo z vodo, ki ne sme odtekati v kanalizacijo. Vodo in ostali kontaminiran material odstranimo ustrežno predpisom.
- **Požar:** Sredstva za gašenje: razpršena voda, pena, suha sredstva za gašenje, CO₂. Pri gorjenju lahko nastajajo: ogljikov monoksid, žveplov oksid in žveplovodik. Osebna varovalna sredstva: dihalni aparat, na kemikalije odporna varovalna obleka. Vodo od gašenja ločeno zbiramo, ne sme dospeti v kanalizacijo in vodotoke. Ostanke in vodo od gašenja odstranimo ustrežno predpisom.

V primeru nesreče med prevozom:

- Ugasnite motor vozila, pogasite odprti ogenj in ne kadite.
- Zavarujte mesto dogodka in opozorite ostale udeležence v prometu.
- Preprečite širjenje sredstva po okolici s posipanjem.
- Obvestite najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali Center za obveščanje (tel. št. 112).
- Za potrebne dodatne informacije se obrnite na zastopnika.

Polyram® DF

Ravnanje z embalažo

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstvo, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadke, skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo brezplačno prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

Etiketa je takšna kot jo je odobril pristojni organ.

Napotki za varnejšo uporabo

Napotki za varovanje uporabnika: Preprečujemo vsak nepotreben stik s sredstvom. Zlorabe lahko vodijo k zdravstvenim težavam. **Pri rokovanju z nerazredčenim sredstvom je potrebno uporabljati:** zaščitno obleko, škornje, rokavice in varovalna očala. Pri rokovanju s škropivom pa: zaščitno obleko, gumijaste škornje in gumijaste rokavice.

Klavzula o jamstvu: Raziskave so pokazale, da je proizvod primeren za uporabo, pri tem pa je potrebno upoštevati navodila o uporabi. Glede na to, da na uporabo in shranjevanje ne moremo vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti vseh okoliščin, ki vplivajo na pripravek, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost proizvoda, medtem ko za rizik pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo.

Skladiščenje:

Polyram® DF je potrebno skladiščiti v dobro zaprti embalaži na zračnem in suhem mestu, zaščitene pred svetlobo in viri toplote, v posebnem prostoru, ki je zaklenjen, ločeno od živil in živalske krme, nedostopnega otrokom in nestrokovnim osebam. Temperatura skladiščenja: do +30 °C. Dovoljenje za promet: MKGP, Fitosanitarna uprava RS, št.: SFS 8007 od 13.01.1998. Datum proizvodnje in številni šarže sta odtisnjena na embalaži. Rok uporabe: 2 leti pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodilo za uporabo.

BASF

The Chemical Company

Polyram® DF

Polyram® DF, Vsebuje: 70 % METIRAM
(tris(amincink-etilen-bis(ditiokarbamat)-tetra-hidro-
1,2,4,7-ditiadiazocin-3,8-dition, polimer),

Močljiva zrnca (DF),

Polyram® DF je preventiven fungicid, namenjen
zatiranju boleznj jablan, hrušk in češpelj, vinske trte,
hmelja, zelenjave, okrasnih rastlin in sončnic.

V stiku s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

Hraniti zunaj dosega otrok.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Pri ravnanju ne jesti, piti in ne kaditi.

Preprečiti stik s kožo.

Strupen za ljudi, ribe in toplokrvne živali.

Proizvaja:

BASF

Aktiengesellschaft

D-6700 Ludwigshafen

Nemčija

Zastopa:

BASF

Slovenija d.o.o.

Dunajska 111a

1000 Ljubljana



dražilno

Prodaja:

Metrob d.o.o.

Začret 20a

3202 Ljubecna

Tel.: 03 78 06 330

Vsebina: 1 kg



4 0 1 4 3 4 8 1 6 1 3 2 6 2