

BASF
The Chemical Company

Ronilan® DF

Skladiščenje: Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem, primerno hladnem prostoru (največ 40 °C), nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, oddaljeno od virov vžiga, ločeno od živil in krmil. Dovoljenje za promet: MKGP, Fitosanitarna uprave RS, št.: SFS 7043 od 20.03.1997. Rok uporabe: 2 leti od dneva proizvodnje pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži. Štev. šarže in datum proizvodnje sta oddtisnjena na embalaži. Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca. Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno! Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodilo za uporabo.

® = zaščitni znak BASF

81011841SI011514-Slovenia

Ronilan® DF, Vsebuje: 500 g/kg vinklozolin, CAS: 50471-44-8, (RS)-3-(3,5-diklorfenil)-5-metil-5-vinil-1,3-oksazolidin-2,4-dion, Ronilan DF je kontaktni fungicid za zatiranje gnilob in plesni vinske trte, jagod, koščičastega sadja, oljne ogrščice in sončnic, zelenjave in okrasnih rastlin v količini 0,6–2,0 kg/ha.

Močljiva zrnca (WG)

Možen rakotvoren učinek.

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

Lahko škoduje plodnosti.

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Preprečiti stik s kožo.

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč.

Po možnosti pokazati etiketo.

Proizvaja:
BASF Aktiengesellschaft
67056 Ludwigshafen
Nemčija

Zastopa:
BASF Slov.
Dunajska 111a
1000 Ljubljana

Prodaja:
Metrob d.o.o.
Začret 20a
3202 Ljubečna
Tel.: 03 78 06 330

T



STRUPENO



Vsebina: **100 g**

Ronilan® DF

UPORABLJA SE ZA ZATIRANJE NA:

- a) vinski trti - siva plesen (*Botrytis cinerea*)
v količini 1 kg/ha (10 g/100 m²). V eni rastni sezoni so dovoljena največ tri škropljenja (prvo v fazi cvetenja, zadnje pa vsaj 28 dni pred obiranjem);
- b) jagodah – gniloba plodov (*Botrytis cinerea*)
v količini 1,5 kg/ha (15 g/100 m²); v eni rastni sezoni so dovoljena največ tri škropljenja;
- c) višnjah ter drugem koščičastem sadju – sušenje poganikov in cvetov (*Monilia laxa*)
v količini 1,5 kg/ha (15 g/100 m²), škropljeno enkrat v fazi cvetenja;
- d) olini ogrščici in sončnicah – bela plesen (*Sclerotinia sclerotiorum*), siva plesen (*Botrytis cinerea*) in črna pegavost (*Alternaria spp.*)
v količini 1 kg/ha in priporočeni porabi vode 400–600 l vode/ha (10 g v 4–6 l vode/100 m²), ob največ dveh škropljenjih v isti rastni sezoni (zadnje v prvi polo-vici cvetenja);
- e) solati – bela gniloba (*Sclerotinia spp.*) in siva plesen (*Botrytis cinerea*)
v količini 0,6 kg/ha (6 g/100 m²), največ dvakrat, od faze ko je razvitih 4–5 listov naprej. Uporaba sredstva v fazi razvitega 1–4 lista lahko povzroči fitotoksičnost;
- f) čebuli, paradižniku, grahu in kumarah za solato – siva plesen (*Botrytis cinerea*)
v količini 1–2 kg/ha in priporočeni porabi vode 600 l/ha (10–20 g v 6 l vode/100 m²), največ dvakrat v eni rastni sezoni in prepovedjo škropljenja kumar za vlaganje;
- g) tulipanah in gladiolah – siva plesen (*Botrytis cinerea*),
cebulice namakamo v 0,2% suspenziji 15 minut;
- h) krizantemah – siva plesen (*Botrytis cinerea*)
škropljenje z 0,05%-no suspenzijo v času odpiranja popkov.

Ronilan® DF

KARENCA:

7 dni za kumare za solato (na odprtem in v rastlinjaki); 14 dni za jagode in fižol; 21 dni za paradižnik (na odprtem in v rastlinjaki); 28 dni za vinsko trto, čebulo in grah; 35 dni za glavno solato ter 42 dni za sončnice, oljno ogrščico in višnje.

PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO:

Potrebno količino sredstva med mešanjem počasi vsujemo v z vodo do 1/2 napolnjen rezervoar škropilnice. Vsebino dopolnimo s preostalo količino vode.

FITOTOKSIČNOST:

Sredstvo, uporabljeno v predpisani količini, na pravilen način in v optimalnem času, ni fitotoksično. To velja za običajne sorte navedenih kultur, za nove, redke ali hibridne sorte pa je pred uporabo priporočljivo narediti preizkus eventuelne fitotoksičnosti. Fitotoksičen učinek je možen na solati, v kolikor jo škropimo v razvojni fazi do štirih pravih listov. Priporočen presledek med škropljenji je 12–15 dni.

MEŠANJE (KOMPATIBILNOST)

SREDSTVA:

Ronilan® DF je dovoljeno mešati s fungicidi, z nekaterimi insekticidi in foliarnimi gnojili. Vsa dodana sredstva je priporočljivo dodajati posamično. Ne sme se mešati z alkalnimi pripravki (bordojska brozga) ter insekticidi izrazito kisle reakcije (dikorvos, dimetoat, heptenofos).

NEVARNE LASTNOSTI:

Pri tretiranju ni dovoljeno jesti, piti ter kaditi. Prav tako ni dovoljeno tretirati proti vetru. **Obvezna je uporaba varovalne obleke in obutve, gumijastih varovalnih rokavic, pokrivala za glavo in zaščitne maske za nos in usta.** Po delu je potrebno temeljito umivanje rok in nezavarovanih delov telesa z vodo in milom. **Žene v plodnem obdobju naj se delu s sredstvom izogibajo.**

Ronilan® DF

Preparat je malo strupen in samo pri daljšem izpostavljanju lahko učinkuje dražeče na kožo in oči, prav tako pri vnašanju skozi usta (peroralno). Zastrupitve ljudi niso opisane. Kot znak dražečega delovanja se lahko pojavi rdečica kože in veznic, pri peroralnem vnašanju pa slabost in bruhanje.

PRVA POMOČ:

kontakt s kožo:

ponesrečenca moramo takoj umiti z veliko količino vode in mila ter odstraniti kontaminirano obleko; po potrebi pokličemo zdravnika.

kontakt z očmi: potrebno takojšnje, vsaj 15 minutno izpiranje z vodo; takoj pokličemo zdravnika.

zaužitje sredstva ali prekomerna inhalacija:

takoj pokličemo zdravnika. Zdravniku pokažemo deklaracijo in navodilo za uporabo sredstva.

Ravnanje z embalažo

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstvo, ki mu je potekel rok

uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za steklenice in plastenke) embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo brezplačno prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

UKREPI ZAŠČITE V PRIME.RU NEZGODE V ZAPRTEM PROSTORU ALI PRI PREVOZU:

1. V primeru nesreče v zaprtem prostoru so potrebni naslednji varnostni ukrepi:

a) Ob uporabi osebnih zaščitnih sredstev (respirator za fini prah, zaščitno oblačilo, zaščitne rokavice) temeljito

Ronilan® DF

poberemo razsuto sredstvo in ga odložimo v kontejner, ki je določen in označen za ta namen.

- b) Zastrupljena tla dobro očistimo s sesalcem za prah in takoj za tem operemo z mešanico vode in detergenta.
- c) Če je prostor zajel požar, pristopimo h gašenju požara s fino razpršeno vodo, prahom ali peno. Potrebno je preprečiti nekontrolirano odtekanje vode za gašenje.

2. Ukrepi zaščite v primeru nesreče pri prevozu:

- a) Ugasnemo motor, pogasimo odprti ogenj in ne kadimo.
- b) Zavarujemo kraj dogodka in opozorimo ostale udeležence v prometu.
- c) Z obvezno uporabo zaščitnih sredstev poškodovano embalažo ločimo od nepoškodovane, poberemo razsuto sredstvo in ga damo v posebno embalažo.
- d) V primeru požara takoj začnemo z gašenjem s sredstvi navedenimi zgoraj.

UKREPI ZA ZAŠČITO ČLOVEKOVEGA OKOLJA PRED ŠKODLJIVIM DELOVANJEM SREDSTVA:

- Sredstvo uporabljamo samo skladno z navodilom za uporabo.
- Ne pripravljamo večjih količin škropilne suspenzije, kot je potrebno za aplikacijo.
- Posodo popolnoma izpraznimo, speremo z vodo in to dodamo v rezervoar škropilnice.
- Slučajne ostanke škropilne suspenzije razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in poškopimo po tretirani površini.
- Kontaminirano vodo, nastalo pri pranju škropilnih agregatov, poškopimo po tretirani površini.
- Preprečimo onesnaženje podzemnih voda, potokov, rek, jezer in morja zaradi škodljivega delovanja sredstva na rastlinski in živalski svet.
- Neporabljeno sredstvo do izteka roka uporabe hranimo pod pogoji, navedenimi za skladiščenje in uporabljamo skladno z navodilom za uporabo, pred uporabo po preteku roka mora proizvajalec ponovno preveriti njegovo kvaliteto.

Ronilan® DF

Etiketa se takšna kot jo je odobril pristojni organ.

Klavzula o jamstvu

Raziskave so pokazale, da je proizvod primeren za uporabo, pri tem pa je treba upoštevati navodila zanj. Glede na to, da na uporabo in shranjevanje ne moremo vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti vse okoliščine, ki vplivajo nanje, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe ali shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost proizvoda, medtem ko za rizik pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo.

Ronilan® DF

Skladiščenje: Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem, primerno hladnem prostoru (največ 40 °C), nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, oddaljeno od virov vžiga, ločeno od živil in krmil. Dovoljenje za promet: MKGP, Fitosanitarna uprave RS, št.: SFS 7043 od 20.03.1997. Rok uporabe: 2 leti od dneva proizvodnje pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži. Štev. šarže in datum proizvodnje sta oddtisnjena na embalaži. Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca. Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno! Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodilo za uporabo.

Ronilan® DF, Vsebuje: 500 g/kg vinklozolin, CAS: 50471-44-8, (RS)-3-(3,5-diklorfenil)-5-metil-5-vinil-1,3-oksazolidin-2,4-dion, Ronilan DF je kontaktni fungicid za zatiranje gnilob in plesni vinske trte, jagod, koščičastega sadja, oljne ogrščice in sončnic, zelenjave in okrasnih rastlin v količini 0,6–2,0 kg/ha.

Močljiva zrnca (WG)

Možen rakotvoren učinek.

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

Lahko škoduje plodnosti.

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Preprečiti stik s kožo.

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč.

Po možnosti pokazati etiketo.

Proizvaja:
BASF Aktiengesellschaft
67056 Ludwigshafen
Nemčija

Zastopa:
BASF Slov.
Dunajska 111a
1000 Ljubljana

Prodaja:
Metrob d.o.o.
Začret 20a
3202 Ljubečna
Tel.: 03 78 06 330

T



STRUPENO



Vsebina: **100 g**