

Stroby® WG

Vsebuje: 50 % kresoksim-metil,
CAS 143390-89-0, metil (E)-2-metoksi imino-
2-[2-(o-toliloksimetil) fenil] acetat

V vodi močljiva zrnca (WG)

Stroby® WG je fungicid za zatiranje bolezni na
jablanah in vinski trt.

Možen rakotvorni učinek. Hraniti izven dosega
otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne
rokavice in zaščitno masko za obraz/oči.

Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati
zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati
etiketo in embalažo. Če pride do zaužitja,
takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati
embalažo in etiketo. Preprečiti spuščanje
v okolje. Strupen za ribe in druge vodne
organizme

Proizvajala:
BASF
Aktiengesellschaft,
67056 Ludwigshafen
Nemčija

Zastopa:
BASF
Slovenija d.o.o.
Dunajska 111a
1000 Ljubljana

Prodaja:
Metrob d.o.o.
Začret 20a
3202 Ljubecna
Tel: 03 78 06 330

Vsebina: **0,6 kg**

X_n



Zdravju škodljivo

N



Okolju nevarno

Skladiščenje:

Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži v suhem in
zračnem prostoru, zaščitenem pred svetlobo in viri toplote, pri temperaturah
do 30 °C, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, ločeno od živil in
krmil. Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca.

Dovoljenje za promet: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Fitosanitarna uprava RS, št.: 3270244/01, z dne, 25.03.2003

Št. šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži.

Rok uporabe: 2 leti pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in
nepoškodovani embalaži.

Pred uporabo preberite navodilo!

Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno!

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodilo za uporabo.



NAČIN DELOVANJA

Stroby® WG je mezostemičen delujoč fungicid z zelo dobrim preventivnim in kurativnim delovanjem. Uporablja se preventivno za zatiranje jablanovega škrlupa in jablanove pepelovke, oidija, črne pegavosti in rdečega listnega ožiga na vinski trti ter breskovega škrlupa. Pripravek je v obliki močljivih zrnec temno rjave barve, blagega značilnega vonja. Deluje mezosistemsko. Aktivna snov nanesa na zelene dele rastlin se širi enakomerno, tudi skozi list v plinasti obliki in tako enakomerno štiti vse njene zelene dele. V povprečju ostane aktivna snov na rastlini 12–14 dni kolikor so tudi priporočeni razmaki med tretiranj. Sredstvo vzpodbuja rastlino k tvorbi lastnega obrambnega sistema in bujnejšo obarvanost listja, zato priporočamo večkratno tretiranje, sredstvo uporabimo večkrat zaporedoma. Tretiramo lahko, ko je listje vlažno (jutranja rosa). Dve uri potem, ko se škropivo na listju posuši, se ne izpere več.

UPORABA

Stroby WG je mezostemično delujoč fungicid s preventivnim, kurativnim in eridikativnim delovanjem, ki ga uporabljamo:

a) na jablanah za zatiranje **jablanovega škrlupa (*Venturia inaequalis*)** v odmerku 0,075 kg na vsak meter višine krošnje dreves, oziroma pri normalni porabi vode 1000 l na hektar v koncentraciji 0,015% to je 0,15 kg/ha (1,5 g na 10 L vode). Tretirati začnemo, ko je napoved uporabe sistemskih fungicidov, običajno je to v fazi E (rdeči balon – cvetenje): **Stroby® WG** uporabimo največ **2 x zapored**. Naslednja tretiranja ali vsaj dve opravimo z drugimi kontaktnimi ali sistemskimi fungicidi. **Stroby® WG** lahko uporabljamo še **1- 2 krat** v poletnem času. Pri bujnem prirastu listja ali obilnih padavinah (50–60 mm) je razmak med tretiranj 10 dni, pri normalnih pogojih rasti in padavin pa do 14 dni. Pripravek dobro zatira tudi jablanovo pepelovko (*Podosphaera leucotricha*).

b) na vinski trti za zatiranje **oidija vinske trte (*Uncinula necator*)** v odmerku 0,1–0,2 kg/ha oziroma v 0,01 - 0,02 % koncentraciji (1–2 g na 10 L vode) Prvič tretiramo tik pred ali v času cvetenja in čez 12 do 14 dni tretiranje ponovimo. Pri presledkih med tretiranj do 10 dni uporabim 0,1 kg/ha (1 g na 10 L vode); 0,15 kg/ha uporabimo pri presledkih škropljenj 12 dni in 0,2 kg/ha pri presledkih več kot 12 do 14 dni.

c) na vinski trti za zatiranje **črne pegavosti vinske trte (*Phomopsis viticola*)** v odmerku 0,009 kg/ha (0,9 g na 10 L vode) . Prvič tretiramo v fenofazi D-E (po Baggolini-ju - lističi so razviti) in drugič v F-G (vidni kabernikli-kaberniki so ločeni). V tej fazi zatiramo tudi **rdeči listni ožig (*Pseudoopeziza tracheiphila*)** na katerega **Stroby® WG** tudi dobro deluje.

Stroby® WG delno deluje tudi na **peronosporo vinske trte (*Plasmopara viticola*)** in **sivo plesen vinske trte (*Botryotinia fuckeliana*)** in tako izboljšuje delovanje specifičnim fungicidov.

OPOZORILA

Sredstvo lahko na isti površini uporabimo največ trikrat v eni rastni dobi proti jablanovem škrlupu in proti oidiju vinske trte in dvakrat v eni rastni dobi proti rdečemu listnemu ožigu vinske trte.

Ukrepi za varovanje okolja

Pri uporabi pripravka se moramo ravnati po navodilu za uporabo pripravka.

Stroby® WG je zelo strupen za vodne organizme. Mesto tretiranja mora biti oddaljeno najmanj 20 m od vode.

Mešanje

Ni poznanih omejitev mešanja z drugimi kemičnimi sredstvi za varstvo rastlin in foliarnimi gnojili

Fitotoksičnost

V predpisanih količinah in terminih sredstvo ni fitotoksično.

Karenca: 35 dni za jablane in vinsko trto.

Nevarne lastnosti

Vnašanje večjih količin pripravka v organizem lahko povzroči zastrupitev s pojavom nespecifične simptomatike. Izogibajte se nepotrebne stika s pripravkom ali pripravljeno škroplilno brozgo. Pri delu pazimo, da pripravek ne pride v oči.

Prva pomoč pri zastrupitvi

Splošna navodila

Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro zrachen prostor in jo zavarujte pred mrazom. Zagotovite osnovne življenjske funkcije. Takoj se posvetujte z zdravnikom in mu posredujte podatke o pripravku, ki so na originalni embalaži in v navodilu za uporabo pripravka.

Pri vdihavanju

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnosti za zdravje. Pri vdihavanju večje količine razpršenih delcev se ravnamo po splošnih navodilih.

Stik z kožo

Odstranimo umazano obleko in obutev, kožo dobro umijemo z milom in čisto vodo.

Stik z očmi

Če pride pripravek v oči, jih temeljito izperimo s čisto tekočo vodo.

Pri zaužitju

Takoj izperemo usta s čisto vodo, potem pa popijemo 2–3 dl pitne vode. Poiščemo zdravniško pomoč. Osebi z zoženo zavestjo ne smemo dati ničesar piti, niti ne izzivamo bruhanja.

NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ

Zagotovimo in vzdržujemo osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju damo prisnebni osebi piti aktivno oglje (1 g/kg telesne teže) razredčenega z vodo v razmerju 1 : 4. V primeru zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca. Specifičnega antidota ni.

NADALJEVANJE ZDRAVLJENJA

Zdravljenje je simptomatsko.

Ravnanje v primeru nezgode

V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno opremo in obvestiti pooblaščen osebe.

- V zaprtem prostoru** razsuto sredstvo zberemo v ustrezno posodo. V primeru, da pripravka ne moremo uporabiti, ga oddamo v zbiralnik posebnih odpadkov pri prodajalcu ali pa pri pooblaščenem podjetju. Onesnažena tla umijemo z vodo in detergentom ter prostor prezračimo. Večje količine vode za izpiranje zberemo v ustrezne posode, da ne onesnažimo odtočnih kanalov, stoječih ali tekočih voda.
- V primeru **nesreče pri prevozu** zavarujemo kraj dogodka in opozorimo druge udeležence v prometu, najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali Center za obveščanje, tel. št. 112. Poškodovano embalažo damo v ustrezno označene večje posode. Preprečiti moramo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru.
- V primeru požara gasimo s prahom, ogljikovim dioksidom ali razpršeno vodo. Sredstvo ne gori!

Ravnanje z ostanki sredstva in embalažo

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neuporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnanje mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadke, skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo brezplačno prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesemo na mesto kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

Za podaljšanje uporabnosti sredstvu, ki mu je potekel rok uporabe, se obrnite na prodajalca.

Prazne embalaže ne smemo ponovno uporabiti.

Navodilo za uporabo je takšno kot ga je odobril pristojni organ.

Tehnika uporabe redstva

Preprečevanje nastajanja ostankov

Ne pripravljamo večjih količin škropiva kot je potrebno. Embalažo izpraznimo do konca, izperemo z vodo in to dodamo škropivu v rezervoar škropilnice! Slučajno nastale ostanke škropiva razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in poškopimo po tretirani površini.

Tretiranje

Med vožnjo in tretiranjem škropivo redno mešamo. Še posebej je mešanje potrebno ob prekinutvi dela.

Priprava sredstva za uporabo

Rezervoar škropilnice napolnimo do polovice z vodo, dodamo odmerjeno količino sredstva, mbalažo dobro izperemo in ne zavržemo! Med mešanjem in dolivanjem vode lahko dodamo ostale pripravke, ki nimajo omejitve mešanja.

Ne uporabljamo umazane vode in vode, ki vsebuje mnogo kalcija in železa. Pripravljeni sredstvo takoj uporabimo.

Čiščenje

Škropilnico po uporabi sredstva operemo od dodajanju sredstva za pranje, na koncu izperemo s čisto vodo.

Zaščita pri delu

Zaradi nevarnosti za zdravje se je pri delu s pripravkom potrebno ustrezno zaščititi.

Pri delu pazimo, da ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne vdihavati par in razpršenih delcev škropiva. Ne škropimo v vetrovnem vremenu. Pri delu nosimo ustrezno zaščitno obleko, pokrivalo za glavo, ščitnik za obraz (očala), gumijaste škornje in nepremočljive rokavice. Pri daljšem škropljenju ali škropiljenju v zaprtem prostoru (rastlinjak) nositi zaščitno masko z ustreznim filtrom (filter P2 za trdne in tekoče delce – DIN 3181).

Med delom ne smemo jesti, piti ali kaditi. V primeru kontaminacije in /ali sumu na zastrupitev moramo prekiniti z delom in ukrepamo po navodilih prve pomoči.

Po delu se temeljito umijemo (stuširamo) in preoblečemo. Operemo in očistimo vsa uporabljena zaščitna sredstva. Prav tako s čisto vodo operemo škropilnico.

Klavzula o jamstvu

Raziskave so pokazale, da je proizvod primeren za uporabo, pri tem pa je potrebno upoštevati navodila o uporabi. Glede na to, da na uporabo in shranjevanje ne moremo vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti vseh okoliščin, ki vplivajo na pripravek, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost proizvoda, medtem ko za rizik pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo (filter P2 za trdne in tekoče delce – DIN 3181).

Stroby® WG

Vsebuje: 50 % kresoksim-metil,
CAS 143390-89-0, metil (E)-2-metoksi imino-
2-[2-(o-toliloksimetil) fenil] acetat

V vodi močljiva zrnca (WG)

Stroby® WG je fungicid za zatiranje bolezni na
jablanah in vinski trt.

Možen rakotvorni učinek. Hraniti izven dosega
otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne
rokavice in zaščitno masko za obraz/oči.

Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati
zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati
etiketo in embalažo. Če pride do zaužitja,
takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati
embalažo in etiketo. Preprečiti spuščanje
v okolje. Strupen za ribe in druge vodne
organizme

Proizvajala:
BASF
Aktiengesellschaft,
67056 Ludwigshafen
Nemčija

Zastopa:
BASF
Slovenija d.o.o.
Dunajska 111a
1000 Ljubljana

Prodaja:
Metrob d.o.o.
Začret 20a
3202 Ljubecna
Tel: 03 78 06 330

Vsebina: **0,6 kg**

X_n



Zdravju škodljivo

N



Okolju nevarno

Skladiščenje:

Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži v suhem in
zračnem prostoru, zaščitenem pred svetlobo in viri toplote, pri temperaturah
do 30 °C, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, ločeno od živil in
krmil. Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca.

Dovoljenje za promet: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Fitosanitarna uprava RS, št.: 3270244/01, z dne, 25.03.2003

Št. šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži.

Rok uporabe: 2 leti pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in
nepoškodovani embalaži.

Pred uporabo preberite navodilo!

Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno!

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodilo za uporabo.

