

Universalis

Universalis vsebuje: azoksistrobin - 93,5 g/L; metil(E)-2-[2-[6-(2-cianofenoksi)pirimidin-4-iloksi]fenil]-3-metoksiakrilat; CAS št.: 131860-33-8; folpet - 500 g/L; N-(triklorometiltio)ftalimid; CAS št.: 133-07-3

Fungicid v obliki koncentrata za suspenzijo (SC) za zatiranje nekaterih bolezni vinske trte.



Zdravju škodljivo pri vdihavanju in zaužitju. Možen rakotvoren učinek. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne vdihavati meglice. Če pride do zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Snov in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek. Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Zastopnik: Syngenta Agro d.o.o., Ljubljana, Kržičeva 3;
tel.: 01/436 12 03; faks.: 01/436 12 14

1 L

SKLADIŠČENJE: Pripravek hranite v originalnih, tesno zaprtih posodah, zaščiteno pred svetlobo in vlogo, pri temperaturah, ki niso nižje od 0 °C in ne višje od + 30 °C, ločeno od hrane, pijače in krmil.

Odločbo št.: 327-02-582/2005/6 je dne 22. 12. 2006 izdalo MKGP, Fitosanitarna uprava RS

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponosrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.

Pred uporabo obvezno preberite priloženo navodilo za uporabo in ga shranite.

Rok uporabe in številka šarže sta odtisnjena na embalaži.

24 urna dežurna služba, tel.: 0044 1484 538 444,
Syngenta Alarm Center, Huddersfield, Velika Britanija



SKLADIŠČENJE:

Pripravek hranite v originalnih, tesno zaprtih posodah, zaščiteno pred svetlobo in vlogo, pri temperaturah, ki niso nižje od 0 °C in ne višje od + 30 °C, ločeno od hrane, pijače in krmil.

NAČIN DELOVANJA:

Fungicid s sistemičnim preventivnim in kurativnim delovanjem zaradi aktivne snovi azoksistrobin ter dotikalnim rezidualnim delovanjem zaradi aktivne snovi folpet.

UPORABA:

Na **vinski trti** za zatiranje

- **peronospore vinske trte (*Plasmopara viticola*)** in **oidija vinske trte (*Uncinula necator*)** po cvetenju, ko se oblikujejo jagode

- **crne pegavosti vinske trte (*Phomopsis viticola*)** in **rdečega listnega ožiga vinske trte (*Pseudopeziza trachhephila*)** v razvojni faziji tretji do šesti list razprt (BBCH 13-16) v 0,2% koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L na ha (20 g/10 L vode). Tretirate lahko 2 - 3 krat v rastni sezoni z 8 - 12 dnevnim presledki.

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA:

Pri tretirjanju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevate predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlortsne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje voda 2. reda.

FITOTOKSIČNOST:

Če pripravek uporabljate v predpisanih odmerkih in na ustrezni način, ne bo poškodoval gojenih rastlin, razen v primeru tretiranja v času nizkih temperatur. Takrat se v praksi lahko pojavi razbarvanja polj med žilami na listih, ki s časom izginejo.

OPOZORILO:

Zaradi nevarnosti za razvoj rezistence je priporočljivo Universalis in sorodne pripravke uporabljati največ 2-3 krat v eni rastni dobi.

MEŠANJE Z DRUGIMI PRIPRAVKI:

Sredstvo se na splošno dobro meša z večino sredstev za varstvo vinske trte. O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci na terenu. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO:

Pred uporabo dobro pretresite še zaprto embalažo. Odmerjeno količino sredstva vlijte v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju rezervoar dopolnite z vodo.

KARENCA:

35 dni.

ZAŠČITNA OPREMA:

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in očala. Potrebno je vsakodnevno menjavanje delovne obleke.

V primeru povečane izpostavljenosti, ko je presežena maksimalna dovoljena koncentracija snovi v zraku, uporabljajte ustreznou zaščito za dihala, ki mora biti usklajena z ustreznimi EN standardi (filtrska polmaska, EN 149).

ZNAKI ZASTRUPITVE:

Podatkov o zastrupitvah pri ljudeh ni.

PRVA POMOČ:**Splošni ukrepi:**

Prizadeto osebo umaknite s kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro zračen prostor in jo zavarujte pred mrazom. Zagotovite osnovne življenske funkcije. Tako se posvetujte z zdravnikom in mu posredujte podatke o pripravku, ki so na originalni embalaži in/ali v navodilu za uporabo pripravka.

Stik s kožo:

Takoj odstranite kontaminirano obleko in obutev, kožo pa temeljito umijte z vodo in milom.

Stik z očmi:

Če pride pripravek v oči, jih temeljito izpirajte s čisto vodo, v primeru draženja oči se posvetujte z zdravnikom.

Pri zaužitju:

V primeru zaužitja usta sperite z vodo, ne izzivajte bruhanja, oseba naj popije 2 do 3 dl vode, takoj se posvetujte z zdravnikom.

POZOR:

Osebam z motnjo zavesti ne smete dati ničesar piti, niti ne smete izzivati bruhanja.

NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ:

Zagotovite in vzdržujte osnovne življenske funkcije. V primeru zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca, aplikacija aktivnega oglja in saliničnega odvajala. Zdravljenje je simptomatično.

RAVNANJE V PRIMERU NEZGODE:

V primeru nezgode morate uporabiti vso predpisano zaščitno opremo, zavarovati mesto nesreče in obvestiti pooblaščene osebe.

V zaprtem prostoru:

Če se embalaža poškoduje in sredstvo razlije, razlitu tekočino posipajte z vpojnim sredstvom

(zemlja, peselek, žagovina) in vse skupaj poberite v posebno, za ta namen določeno in označeno posodo. Vsebino te posode oddajte v uničenje podjetju, ki se ukvarja z uničevanjem nevarnih industrijskih odpadkov. Tla in umazane predmete očistite še z vodo in detergentom. Večje količine vode za izpiranje zberite v posode, da preprečite onesnaženje odtočnih kanalov, stoečih in tekočih voda.

Na odprttem prostoru:

Postopajte kot v zaprtem prostoru.

Pri nezgodi med prevozom:

Zavarujte mesto nesreče, preprečite nastajanje nadaljne škode in pokličite Center za obveščanje na tel. št.: 112. Sicer ravnajte kot pri razlitju v zaprtem prostoru.

V primeru požara

Gasite s prahom, peno, CO₂ ali drugimi kemičnimi sredstvi, le izjemoma gasite z vodo. Pri gorenju se sproščajo strupeni plini, zato morate uporabiti dihalne aparate in zaščitno obleko.

RAVNANJE Z OSTANKI SREDSTVA IN PRAZNO EMBALAŽO:

Prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plasenke in steklenice) embalažo lahko odstranite kot neneveren odpadek skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo brezplačno pre-pustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.

Odločbo št.: **327-02-582/2005/6** je dne 22. 12. 2006 izdalo MKGP, Fitosanitarna uprava RS

Navodilo je v skladu z odločbo in takšno, kot ga je odobril pristojni organ.

Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v originalni embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja proizvajalec ne odgovarja.

® zaščitena znamka firme
Syngenta Group Company

© 2006 Syngenta Crop Protection AG

PROIZVAJA:

Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica

ZASTOPNIK:

Syngenta Agro d.o.o., Ljubljana, Kržičeva 3
tel.: 01/436 12 03
faks: 01/436 12 14