

# Ogriol

**Vsebuje:** olje oljne ogrščice ..... 92 %

Koncentrat za emulzijo (EC).

**Ogriol** je sredstvo za varstvo rastlin - insekticid ali dodatek k insekticidom in herbicidom za izboljšanje oprijemljivosti in učinkovitosti.

**ZARADI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI IN OKOLJA, UPOŠTEVAJTE NAVODILA ZA UPORABO.**

## Obvestilni stavki

Hraniti izven dosega otrok.  
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.  
Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

## Izdeluje

Pinus TKI d.d., Grajski trg 21,  
2327 Rače, Tel.: 02/60 90 211



**Pogoji skladiščenja:** Sredstvo hranimo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, pri temperaturi med 5° in 30° C, ločeno od hrane, pijače in krmil, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

**Način delovanja:** Ogriol vsebuje olje oljne ogrščice in ga uporabljamo kot insekticid ali kot dodatek k insekticidom in herbicidom za izboljšanje oprijemljivosti in učinkovitosti.

## Uporaba

### a) sadjarstvo:

- v času mirovanja do razvojne faze mišjega ušesa (ff C-D) za zatiranje **ameriškega kaparja** (*Comstocaspis pernicioso*) in drugih **kaparjev** (*Coccina*) ter za zatiranje zimskih jajčec **rdeče sadne pršice** (*Panonychus ulmi*) v 4 % koncentraciji (400 ml na 10 l vode) na **pečkatem sadnem drevju** in v 3 % koncentraciji (300 ml na 10 l vode) na **koščičastem sadnem drevju**. Rastline je potrebno dobro omočiti.

### ČAS UPORABE



A



B



C



C3



D



D

- **na pečkatem in koščičastem sadnem drevju** v rastni dobi proti **rdeči sadni pršici** (*Panonychus ulmi*), **listnim ušem** (*Aphididae*) in **kaparjem** (*Coccina*) v odmerku 10 l/ha na 1 m višine krone (100 ml na 1 m višine krone na 100 m<sup>2</sup>). Opravimo do 3 škropljenja v rastni dobi.
- proti **pršicam šiškaričam** (*Eriophyidae*) v času selitve v odmerku 10 l/ha na 1 m višine krone (100 ml na 1 m višine krone na 100 m<sup>2</sup>). Škropimo v presledkih 7 do 10 dni. Opravimo 3 škropljenja v rastni dobi.

### b) vinogradništvo:

- proti **rdeči sadni pršici** (*Panonychus ulmi*) proti zimskim jajčecem in prvim ličinkam in **pršicam šiškaričam** (*Eriophyidae*) v odmerku 8 l/ha (80 ml na 100 m<sup>2</sup>). Škropimo v razvojni fazi C-D (volna do prvi lističi). Rastline je potrebno dobro omočiti.

### c) vrtnine:

- **v kapusnicah** (nad 50 cm) proti **mokasti kapusovi uši** (*Brevicoryne brassicae*) v 2 % koncentraciji (200 ml na 10 l vode) ob porabi 600-800 l škropilne mešanice na hektar (6-8 l na 100 m<sup>2</sup>). Škropimo v presledkih 7 do 10 dni in sicer do 3 krat v rastni dobi.
- **v fižolu** proti **navadni pršici** (*Tetranychus urticae*) v 2 % koncentraciji (200 ml na 10 l vode) ob porabi 600 l škropilne mešanice na hektar (6 l na 100 m<sup>2</sup>) za nizek, grmičast fižol in 800 l vode na hektar (8 l na 100 m<sup>2</sup>) za visok fižol. Škropimo do 2 krat v rastni dobi.
- **v ostalih vrtninah** na prostem in pod steklom večjih od 125 cm proti **rastlinjakovemu ščitkarju** (*Trialeurodes vaporariorum*) v 2 % koncentraciji (200 ml na 10 l vode) ob porabi 700 l škropilne mešanice na hektar (7 l na 100 m<sup>2</sup>). Škropimo v 7 do 10 dnevni presledkih in sicer do 6 krat v rastni dobi.

d) **okrasne rastline (iglavci, vrtnice itn.)** na prostem in pod steklom:

- proti **pršicam prelkam (Tetranychidae)**, **kaparjem (Coccina)**, **listnim ušem in ušem na smrekah (Aphididae)**, **rastlinjakovemu ščitkarju (*Trialeurodes vaporariorum*)** v 2 % koncentraciji (200 ml na 10 l vode) ob porabi 700-900 l škropilne mešanice na hektar (7-9 l na 100 m<sup>2</sup>). Škropimo v 7 do 10 dnevni presledkih in sicer največ 3 krat v rastni dobi.

e) Kot **dodatek insekticidom** še posebej za zatiranje **navadne hruševe bolšice (*Cacopsylla pyri*)** in **krvave uši (*Eriosoma lanigerum*)** za povečanje učinkovitosti v 0,5 % koncentraciji (50 ml na 10 l vode).

f) Kot **dodatek herbicidom** za izboljšanje delovanja v odmerku 0,5 - 2 l/ha, odvisno od herbicida in kulture, v kateri ga uporabljamo:

- herbicidom na osnovi sulfonilsečnine dodamo 1 - 2 l/ha (10 - 20 ml/100 m<sup>2</sup>);
- herbicidom za uporabo v sladkorni pesi dodamo 0,5 - 2 l/ha (5 - 20 ml/100 m<sup>2</sup>). Večji odmerki uporabljamo, ko so pesa in pleveli že večji.

**Opozorila:** Pri škropljenju moramo preprečiti onesnaževanje voda (vodotoki, vodnjaki, jezera in izviri) s tem, da škropimo najmanj 20 m od njih.

**Fitotoksičnost:** Pripravek je lahko fitotoksičen za okrasne rastline. Zaradi možne občutljivosti rastlin na ogrščično olje (okrasne rastline, vrtnine itd.) je potrebno pred uporabo preveriti možno fitotoksičnost na manjšem številu rastlin. Če so rastline prizadete zaradi izrazito nizkih ali visokih temperatur (nad 22°C v senci), prevelike vlage ali suše, so močno poškodovane zaradi toče ali škodljivcev, uporabo pripravka odsvetujemo. V času škropljenja morajo biti rastline suhe.

**Mešanje:** V primeru mešanja z drugimi fitofarmaceutskimi pripravki se posvetujte s strokovnjakom.

**Priprava sredstva za uporabo:** Odmerjeno količino sredstva ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

**Karenca:** karence ni

**Znaki zastrupitve:** Pri stiku z očmi sredstvo lahko deluje dražeče. V primeru zaužitja večje količine pripravka se lahko pojavi slabost, bruhanje in driska, možna je tudi depresija centralnega živčnega sistema.

**Prva pomoč:** Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro zračen prostor in zagotovimo osnovne življenjske funkcije. Pokličemo zdravnika in mu pokažemo embalažo pripravka in/ali navodilo za uporabo pripravka.

Vdihavanje: Pri pravilni uporabi ni pričakovati nevarnosti za zdravje.

Stik s kožo: Odstranimo kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijemo z vodo in milom. Pred ponovno uporabo delovno obleko očistimo

Stik z očmi: Oči speremo s čisto vodo.

Zaužitje: Ne izzivajmo bruhanja, posvetujmo se z zdravnikom.

**Nujna zdravniška pomoč:** Zdravljenje je simptomatično.

**Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta:** V primeru nezgode pazimo, da sredstvo ne izteka v kanalizacijo, tekoče ali stoječe vode. V primeru večjega razlitja po sredstvu potresemo vpojni material (žaganje, mivka, zemlja). Pripravek ni gorljiv.

**Zaščita pri delu:** Pri delu pazimo, da ne vdihavamo škropilne meglice in da sredstvo ne pride v oči. Priporoča se uporaba ustrezne zaščitne opreme (delovne obleke, rokavic, ščitnika za obraz ali očal).

**Ravnanje z ostanki in prazno embalažo:** Prazno embalažo splaknemo s čisto vodo, ki jo uporabimo kot škropivo, plastenko pa odložimo na komunalno odlagališče. Sredstvo je možno uničiti kot komunalni odpadki biološke narave.

**Odločba o registraciji št. 32702250/00** z dne **15.01.2001** in dopolnitev **št. 327-02-228/2003** z dne **24.07.2003** Fitosanitarne uprave RS, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

**Etiketa z navodilom za uporabo je v skladu z odločbo o registraciji.**

Proizvajalec jamči za kvaliteto sredstva, dokler je v originalni embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja, proizvajalec ne odgovarja.