

PPE204262 - L120430 SLOV111



Archer® Top 400 EC

Koncentrat za emulzijo (EC) - sistemični fungicid za zatiranje žitne pepelovke, rj in drugih boleznih listja, klasa in stebela na pšenici in ječmenu.

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica

N način uporabe: Pred uporabo je treba pripravek zmešati z vodo v emulzijo. Škropiti s škropilnicami, ki se navadno uporabljajo za škropljenje žit.

Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži. Pred uporabo je treba obvezno prebrati navodilo za uporabo, ki je priloženo embalaži.

24 urna dežurna služba, tel.: 00 44 1484 538 444
Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, VB



3 831053 985108

1 L



syngenta





Archer[®] Top 400 EC

PPE204262 - L120430 SLOV/111



Archer Top 400 EC vsebuje: 125 g/L propikonazola: (+/-)-1-[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol; CAS št.: 60207-90-1 in 300 g/L fenpropidina: (RS)-1[3-(4-tert-butilfenil)-2-metilpropil]piperidin; CAS št.: 67306-00-7; 50 g/L Ca-soli dodecil benzensulfonske kisline; CAS št.: 70528-83-5 in kot topilo mešanico aromatskih ogljikovodikov cca. 384,2 g/L; CAS št.: 64724-94-5

X_n

ZDRAVJU ŠKODLJIVO

N

OKOLJU NEVARNO

Koncentrat za emulzijo (EC) - sistemični fungicid za zatiranje žitne pepelovke, rj in drugih boleznih listja, klasa in stebela na pšenici in ječmenu.

Vnetljivo. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Draži oči, dihala in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja. Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01/436 12 03, faks: 01/436 12 14

1 L

Izdaja le na podlagi veljavnega potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine.

Skladiščenje: v izvorni, zaprti embalaži, pri temperaturah med +35°C in 0°C, zavarovano pred soncem in vlago.

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v navodilu za uporabo.

Odločbo št.: **32702221/00** z dne 19. 12. 2000, spremembo odločbe št.: **32702265/01** z dne 9.8.2001 in spremembo odločbe št.: **327-02-221/00/2** je dne 7.5.2004 izdalo MKGP, Fitosanitarna uprava RS

Rok uporabe in številka šarže sta odtisnjena na embalaži.





Archer Top 400 EC vsebuje: 125 g/L propikonazola: (+/-)1-[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol; CAS št.: 60207-90-1 in 300 g/L fenpropidina: (RS)-1[3-(4-tert-butilfenil)-2-metilpropil]piperidin; CAS št.: 67306-00-7; 50 g/L Ca-soli dodecil benzensulfonske kisline; CAS št.: 70528-83-5 in kot topilo mešanico aromatskih ogljikovodikov cca. 384,2 g/L; CAS št.: 64724-94-5



Koncentrat za emulzijo (EC) - sistemski fungicid za zatiranje žitne pepelovke, rj in drugih boleznih listja, klasa in stebela na pšenici in ječmenu.

Vnetljivo. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Draži oči, dihala in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja. Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01/436 12 03, faks: 01/436 12 14

1 L

Izdaja le na podlagi veljavnega potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine.

Skladiščenje: v izvorni, zaprti embalaži, pri temperaturah med +35°C in 0°C, zavarovano pred soncem in vlago.

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v navodilu za uporabo.

Odločbo št.: **32702221/00** z dne 19. 12. 2000, spremembo odločbe št.: **32702265/01** z dne 9.8.2001 in spremembo odločbe št.: **327-02-221/00/2** je dne 7.5.2004 izdalo MKGP, Fitosanitarna uprava RS

Rok uporabe in številka šarže sta odtisnjena na embalaži.

Uporaba:

Uporaba **na pšenici** in **ječmenu** za zatiranje: **žitne pepelovke (*Blumeria graminis*)**, **rjavenja pšeničnih plev (*Stagonospora nodorum*)**, **pšenične listne pegavosti (*Mycosphaerella graminicola*)**, **fuzarioz (*Fusarium* spp.)**, **rj (*Puccinia* spp.)**, **ječmenove mrežaste pegavosti (*Pyrenophora teres*)** in **rženega (ječmenovega) listnega ožiga (*Rhynchosporium secalis*)** v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m²).

Tretira se v razvojni fazi od začetka razvoja zadnjega lista do faze odpiranja listne nožnice (faza 37-49), oziroma ob prvem pojavu simptomov pepelovke. V primeru močnih zgodnjih okužb s pepelovko sta potrebni dve tretiranji.

Varovanje okolja:

Pri uporabi pripravka se morate obvezno ravnati po navodilu za uporabo. Preprečiti morate onesnaženje tekočih in stoječih voda in vodnih virov s pripravkom, ker je strupen za vodne organizme. Posevki, ki jih škropite, morajo biti najmanj 20 m oddaljeni od voda. Paziti, da na sveže škropljeno površino ne zaide živina.

Fitotoksičnost (občutljivost rastlin):

Pripravek ne povzroča poškodb na žitu, če se uporablja v skladu s priporočili.



Kompatibilnost (mešanje z drugimi pripravki):

Archer Top 400 EC se lahko meša z drugimi pripravki za varstvo rastlin, regulatorji rasti in gnojili, a je priporočljivo, da to predhodno preverite v manjši posodi. V odmerjeno količino vode dajte predpisano količino posameznih pripravkov, pri čemer dodajajte sredstva v naslednjem vrstnem redu: najprej sredstva v obliki močljivih praškov ali zrn (WP, WG oz. DF formulacije), nato sredstva v obliki koncentriranih suspenzij (SC in SE formulacije) in na koncu sredstva v obliki koncentratov za emulzijo (EC in DC formulacije) ali listna gnojila. Mešanico dobro premešajte in jo pustite stati 5 minut. Če je tako pripravljena škropilna brozga tudi po 5 minutah homogena, oziroma jo je mogoče z mešanjem homogenizirati, so uporabljena sredstva med seboj fizikalno združljiva.

Priprava škropilne brozge:

Rezervoar škropilnice do polovice napolnite s čisto vodo, dodajte odmerjeno količino pripravka in rezervoar dopolnite z vodo. Mešalo mora biti vključeno ves čas med pripravljanjem škropilne brozge in med škropljenjem. Škropite s šobami, ki se navadno uporabljajo za škropljenje s fungicidi.

Karenca: 35 dni za pšenico in ječmen.

Znaki zastrupitve in prva pomoč:

Zastrupitve in znaki zastrupitev pri človeku niso znani.

Če se pokažejo nespecifični znaki, kot so slabost, glavobol, bruhanje in sumite na zastrupitev, je treba poklicati zdravnika, do njegovega prihoda pa ponesrečenemu nuditi prvo pomoč. Obolelo osebo je treba spraviti na svež zrak ali v zračen prostor in paziti, da se ne podhladi.

V primeru kontakta pripravka s kožo, je treba sleči obleko in prizadete dele kože dobro umiti z milom in vodo.

Če je pripravek prišel v oči, jih je treba dalj časa izpirati s čisto vodo (najmanj 15 minut).

Pri zaužitju dajte obolelemu medicinsko oglje z mnogo vode.

Če oseba ni pri zavesti, se ji ne sme dati ničesar piti, niti se ne sme izzivati bruhanja.

Zdravljenje: Specifičnega protistrupa ni, zdraviti po znakih obolenja.

Varnostni ukrepi v primeru nezgode v zaprtem prostoru ali pri prevozu:

V zaprtem prostoru: Če se poškoduje embalaža in se pripravek polije, ga morate posipati s sredstvom, ki vpija tekočino (zemlja, pesek, žagovina) in vse skupaj spraviti v posebno za to določeno in označeno posodo.

Vsebinsko te posode predajte podjetju, ki se ukvarja z uničevanjem industrijskih odpadkov. Politno mesto morate očistiti z vodno raztopino deter-

genta. Pri delu morate uporabljati osebna zaščitna sredstva. Po opravljenem delu se morate dobro umiti.

Pri prevozu: Ugasnite motor vozila, ne kadite. Zavarujte mesto nezgode in nanjo opozorite ostale udeležence v prometu. Ločite poškodovano embalažo od nepoškodovane. Preprečite širjenje tekočine v okolico s posipanjem (zemlja, pesek) ali z nasipom ter napojen material spravite v posebno označeno posodo in dalje ukrepajte, kot je navedeno zgoraj. O nezgodi obvestite Center za obveščanje na tel. št.: 112.

Postopek z ostankom pripravka in s prazno embalažo:

Prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva in sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za steklenice in plastenke) embalažo lahko odstranite kot nenevaren odpadek skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo brezplačno prepustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.

Navodilo je takšno, kot ga je odobril pristojni organ.

Obseg jamstva:

Proizvajalec jamči za kakovost pripravka, dokler se prodaja v izvorno zaprti embalaži. Za škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega shranjevanja pripravka, proizvajalec ne odgovarja.

® zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

© 2001 Syngenta Crop Protection AG

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica

Zastopnik:

Syngenta Agro d.o.o.,

Ljubljana, Kržičeva 3,

tel.: 01/436 12 03

faks: 01/436 12 14