

PPE205335

L120759 SLOW/121

BASUDIN® 600 EW



Kontaktni insekticid v obliki emulzije-vode v olju (EW), za zatiranje škodljivih žuželk na sadnem drevju, vrtnah in poljščinah.

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica

Pred uporabo obvezno preberite priloženo navodilo za uporabo in ga shranite!

Izdaja le na podlagi veljavnega potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine.

® zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

24 urna dežurna služba, tel.: 00 44 1484 538 444,
Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, VB



3 831053 1911107



1 L

syngenta



BASUDIN® 600 EW

Vsebuje: 600 g/l diazinona; 0,0-dietil-0,2-izopropil-6-metilpirimidin-4-il-fosforotioat; CAS št.: 333-41-5, kemijski razred: organofosfat, 1% 1-2-benzizotiazol-3(2H)-on; CAS št.: 58249-25-5

Kontaktni insekticid v obliki emulzije-vode v olju (EW), za zatiranje škodljivih žuželk na sadnem drevju, vrtninah in poljščinah.



Zdravju škodljivo pri zaužitju. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Strupeno za čebele.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

Pripravek mora biti zaščiten pred soncem.

Antidot: atropin v kombinaciji s PAM-om ali toxogoninom.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01/4361203, faks: 01/436 12 14

11

Hranite: v originalnih, zaprtih posodah, v zračnem prostoru pri temp. med -10 in +35°C.

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.

Odločbo št.: **SFS 9109** z dne 14. 7. 1999, spremembo odločbe št.: **32702265/01** z dne 9.8.2001 in spremembo odločbe št.: **327-02-197/2004/1** je dne **22.4.2004** izdalo MKGP, Fitosanitarna uprava RS.

Rok uporabe in številka šarže sta odtisnjena na embalaži.



BASUDIN® 600 EW

Vsebuje: 600 g/l diazinona; 0,0-dietil-0,2-izopropil-6-metilpirimidin-4-il-fosforotioat; CAS št.: 333-41-5, kemijski razred: organofosfat, 1% 1-2-benzizotiazol-3(2H)-on; CAS št.: 58249-25-5

Kontaktni insekticid v obliki emulzije-vode v olju (EW), za zatiranje škodljivih žuželk na sadnem drevju, vrtninah in poljščinah.



Zdravju škodljivo pri zaužitju. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Strupeno za čebele.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

Pripravek mora biti zaščiten pred soncem.

Antidot: atropin v kombinaciji s PAM-om ali toxogoninom.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01/4361203, faks: 01/436 12 14

1 |

Hranite: v originalnih, zaprtih posodah, v zravnem prostoru pri temp. med -10 in +35°C.

V primeru zastupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.

Odločbo št.: **SFS 9109** z dne 14. 7. 1999, spremembo odločbe št.: **32702265/01** z dne 9.8.2001 in spremembo odločbe št.: **327-02-197/2004/1** je dne **22.4.2004** izdala MKGP, Fitosanitarna uprava RS.

Rok uporabe in številka šarže sta odtisnjena na embalaži.



HRANITE:

v originalnih, zaprtih posodah, v dobro prezračenem prostoru pri temp. med -10 in +35°C.

UPORABA:

Basudin 600 EW se uporablja kot kontaktni insekticid:

a) **na jablanah** za zatiranje:

- **jabolčnega zavijača (*Cydia pomonella*), sadnega zavijača (*Grapholita spp.*), sadne grizlice (*Hoplocampa spp.*) in listnih uši (*Aphididae*)** v odmerku 1-1,3 l/ha (v konc. 0,1-0,13% pri porabi vode 1000 l/ha, to je 10-13 ml/10 l vode).
- **sadnega listnega zavrtača (*Lyonetia clercella*)** in gibljivih oblik **kaparjev (*Coccidae* in *Pseudococcidae*)** v odmerku 1,5 l/ha, oz. v 0,15% konc. (15 ml/10 l vode).

b) **na hruškah** za zatiranje:

- **listnih uši (*Aphididae*) in sadnega zavijača (*Grapholita spp.*)** v odmerku 1-1,3 l/ha (v konc. 0,1-0,13% pri porabi vode 1000 l/ha, to je 10-13 ml/10 l vode).
- gibljivih oblik **kaparjev (*Coccidae* in *Pseudococcidae*)** v odmerku 1,5 l/ha, oz. v 0,15% konc. (15 ml/10 l vode).

c) **na češnjah in slivah** za zatiranje:

- **listnih uši (*Aphididae*)** v odmerku 1-1,3 l/ha (v konc. 0,1-0,13 % pri porabi vode 1000 l/ha, to je 10-13 ml/10 l vode).
- gibljivih oblik **kaparjev (*Coccidae* in *Pseudococcidae*)** v odmerku 1,5 l/ha, oz. v 0,15% konc. (15 ml/10 l vode).

d) **na paradižniku in papriki** za zatiranje:

- **ščitkarjev (*Trialeurodes vaporariorum* in *Bemisia tabaci*), resarjev (*Thrips spp.*), listnih uši (*Aphididae*) in gosenic (*Mamestra spp.*, *Pieris spp.*, *Plutella spp.*)** v odmerku 0,7 do 1,3 l/ha (7-13 ml/100 m²).

e) **na paradižniku, papriki in korenju** za zatiranje:

- talnih škodljivcev, kot so **sovke (*Nocutidae*), bramor (*Gryllotalpa gryllotalpa*), strune (*Elateridae*)** **na vrtninah** z zalivanjem oz. namakanjem (velika poraba vode) ob setvi ali presajanju v odmerku 3-5 l/ha (30-50 ml/100 m²).

f) **na okrasnih rastlinah** za zatiranje:

- talnih škodljivcev, kot so **bramor (*Gryllotalpa gryllotalpa*) in strune (*Elateridae*)** v odmerku

2,5-3,5 l/ha (25-35 ml/100 m²).

Ker je strupen za čebele, ne škropite v času cvetenja.

VAROVANJE OKOLJA:

Preprečite onesnaženje vodnih virov, stojećih in tekoćih voda in škropite najmanj 20 m od njih.

FITOTOKSIČNOST (Obćutljivost rastlin):

Sredstvo, uporabljeno v predpisanih kolićinah in na ustrezen naćin, ni fitotoksićno za gojene rastline.

KOMPATIBILNOST (možnost mešanja z drugimi pripravki za varstvo rastlin):

Pripravek se lahko meša z većino standardnih insekticidov in fungicidov, z izjemo alkalnih (žvepleno apnena brozga, baker). Pripravka ne smete mešati s pripravki, ki vsebujejo kaptan. V primeru dvoma priporoćamo izvedbo manjšega testa mešanja.

PRIPRAVA ŠKROPILNE BROZGE:

Odmerjeno kolićino sredstva pomešajte najprej z malo vode, da dobite gosto emulzijo, ki jo nato preko sita vlijete v rezervoar škropilnice, do polovice napolnjen s ćisto vodo. Ob stalnem mešanju rezervoar dopolnite z vodo.

KARENCA:

21 dni za jabolane, hruške, ćešnjje, slive, 14 dni za korenje in papriko, 3 dni za paradižnik. Pri zalivanju oziroma namakanju tal ob setvi ali presajanju je karenca zagotovljena s ćasom uporabe.

ZNAKI ZASTRUPITVE IN PRVA POMOĆ:

Znaki zastrupitve so glavobol, slabost, znojenje, bruhanje, teŹave pri poŹiranju, v teŹjih primerih bolećine mišć, krći, oteŹeno dihanje, nezavest.

Pri stiku s koŹo obleko takoj odstranite, koŹo pa temeljito operite z vodo in milom.

Će pride pripravek v oći, jih takoj sperite z veliko vode.

Pri zauŹitju pripravka mora zastrupljenec, će je pri zavesti, piti vodo in medicinsko oglje. Ne smete mu dajati alkoholnih pijać ali mleka.

Nezavestnim ne dajte nobenih tekoćin in ne izzivajte bruhanja.

Pri prizadetem bolniku preverite dihanje in pulz. V vsakem primeru poišćite embalaŹo in navodilo za uporabo ter se posvetujte z zdravnikom.

NAPOTKI ZA ZDRAVNIKA:

Pripravek sodi v skupino organskih fosfornih insekticidov in je inhibitor holinesteraze.

ANTIDOT je atropin v kombinaciji s PAM-om ali toxogoninom. Injecirati 2 do 4 mg atropin sulfata vsakih 5 do 10 minut do pojava atropinizacije. Ponesrećenec naj većkrat pije 200 do 300 ml 2-3% vodne raztopine natrijevega bikarbonata, spiranje Źelodca, nato dati natrijev sulfat (Na₂SO₄). Proti krćem dajati diazepam (10 mg), ponoviti vsakih 30-60 minut. Kontrola ledvic, jeter in kalija v krvi.

UKREPI PRI NEZGODI:

V zaprtem prostoru: Će se poškoduje embalaŹa in se pripravek razlije, ga posipajte z vpojnim sredstvom (pesek, zemlja, Źagovina...) in poberite v posebej za to namenjene in oznaćene posode, ki se tesno zapirajo, vse skupaj predajte v unićenje podjetju, ki se ukvarja z unićevanjem industrijskih odpadkov. Tla oćistite z vodo in detergentom in tudi to vodo poberite v doloćene posode. Zaprite dostop na kontaminirano obmoćje za daljši ćas. Pri delu obvezno uporabljajte osebna zašćitna sredstva. V primeru poŹara gasite s peno, prahom ali CO₂.

Pri prevozu: Ugasnite motor vozila, cigarete in drug odprt ogenj, zavarujte mesto nezgode in nanjo opozorite ostale udeleŹence v prometu ter obvestite najbliŹjo policijsko postajo. Preprećite širjenje razlitnega pripravka v okolico z nasipom. Poberite razlići pripravek in dalje ukrepajte, kot je navedeno zgoraj.

RAVNANJE Z OSTANKI SREDSTVA IN PRAZNO EMBALAŹO:

Prazno embalaŹo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, morate oddati pooblašćenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja podroćje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalaŹo in odpadno embalaŹo.

Odločbo št.: **SFS 9109** z dne 14.7.1999,
spremembo odločbe št.: **32702265/01** z dne 9.8.2001 in
spremembo odločbe št.: **327-02-197/2004/1** je dne **22.4.2004** izdalo MKGP, Fitosanitarna uprava
RS.

Navodilo za uporabo je takšno, kot ga je odobril pristojni organ.

® zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

© 2001 Syngenta Crop Protection AG

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica

Zastopnik:

Syngenta Agro d.o.o., Ljubljana, Kržičeva 3,

tel.: 01/436 12 03

faks: 01/436 12 14