FUSILADE FORTE™

3 831053 943108

Fusilade Forte je herbicid v obliki koncentrata za emulzijo za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela.

Vsebuje: *150 g/l fluazifop-P-butila; (butil(RS)-2-(4-(5-trifluorometil-2-piridiloksi)fenoksi)propionat); CAS št.: 79241-46-6; 100 g/l oktan-1-ola; CAS št.: 111-87-5; 150 g/l oleil-poliglikol etra z etilen oksidom; CAS št.: 9004-98-2 in 25 g/l kalcijevega benzen sulfonata; CAS št.: 26264-06-2.*

X_n

ZDRAVJU ŠKODLJIVO

N

OKOLJU NEVARNO

Draži kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Možnost škodovanja nerojenemu otroku.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Zastopnik:
Syngenta Agro, d.o.o.
Kržičeva 3, Ljubljana
tel.: 01/436 12 03
faks: 01/436 12 14

1 l

PPE206431 ***L121093*** *SLOV/1J*

FUSILADE FORTE™

Herbicid v obliki koncentrata za emulzijo.

Uporablja se za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela v poljščinah, vrtninah, sadovnjakih, vinogradih, drevesnicah odraslih rastlin, jagodah in tobaku.

Skladiščenje: *v suhem in zračnem prostoru, izven dosega otrok, pri temperaturah med -10°C in 40°C, ločeno od vnetljivih snovi.*

Odločbo št.: ***32702233/01*** *je dne* ***13.11.2001*** *izdalo MKGP, Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo.*

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečenemu nudite prvo pomoč, kot je opisano v priloženem navodilu za uporabo.
Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži.
Izdaja le na podlagi veljavnega potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine.
Rok uporabe: *je odtisnjen na embalaži.*
Številka šarže: *je odtisnjena na embalaži.*

Proizvajalec:
Syngenta Limited
Fernhurst, Velika Britanija

™ blagovna znamka firme Syngenta Group Company

1 l

syngenta

driska in bolečine v mišicah.

Prva pomoč:
Splošni ukrepi: prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak in zagotovite osnovne življenjske funkcije. Pokličite zdravnika in mu pokažite embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.
Pri stiku s kožo: Odstranite kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijte z vodo in milom.
Pri stiku z očmi: oči temeljito izperite z vodo in se posvetujte z zdravnikom.
Pri vdihavanju: ukrepajte po splošnih navodilih.
Pri zaužitju: Izperite usta, oseba naj popije 2 do 3 dl vode, bruhanja ne izzivajte, takoj se posvetujte z zdravnikom.

Osebi z moteno zavestjo ne smete dati ničesar piti, niti ne izzivati bruhanja!
Nujna zdravniška pomoč:
V primeru zaužitja koncentriranega pripravka dajte prisebni osebi piti aktivno oglje razredčeno z vodo v razmerju 1:4, pri zaužitju večje količine pa je indicirano izpiranje želodca, vendar pri tem pazimo, da ne pride do aspiracije želodčne vsebine.

Nadaljevanje zdravljenja: Specifični antidot ni znan. Zdravljenje je simptomatično.

Ravnanje v primeru nesreče pri prevozu in v zaprtem prostoru:
Takoj obvestite organe javne varnosti, zavarujte mesto nesreče in preprečite nastajanje nadaljnje škode. Ponesrečenim osebam nudite prvo pomoč in pokličite zdravnika.
Če je prišlo do razlitja, morate tla posuti z vpojnim sredstvom (zemlja, pesek, mivka, žagovina) in to dati v dobro zaprto posodo. Tla in ostale umazane predmete očistite še z vodo in detergentom.
Če pride do požara, gasite vedno le s prahom, CO_2 ali drugimi kemičnimi sredstvi, le v skrajnem primeru z vodo. Ne smete uporabljati vodnih curkov. Pri gorenju se sproščajo strupeni plini, zato je potrebno uporabiti dihalne aparate in zaščitno obleko.

Ravnanje z ostanki sredstva in prazno embalažo:
Prazno embalažo, ostanke neporabljenega pripravka ali pripravka, ki mu je potekel rok uporabnosti, morate oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

Odločbo št.: **32702233/01** je dne **13.11.2001** izdalo MKGP, Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo.

Navodilo za uporabo je takšno, kot ga je odobril pristojni organ.

Splošne opombe:
Proizvajalec jamči za kvaliteto sredstva, dokler je v originalni embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja, proizvajalec ne odgovarja.

™ blagovna znamka firme Syngenta Group Company
© 2001 Syngenta Crop Protection AG

Proizvajalec:
Syngenta Limited, Fernhurst, Velika Britanija
Zastopnik:
Syngenta Agro d.o.o., Ljubljana, Kržičeva 3

PPE206431 *L121093 SLOV/1J*

FUSILADE™ FORTE

Herbicid v obliki koncentrata za emulzijo za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela.

Vsebuje: *150 g/l fluazifop-P-butila: (butil(RS)-2-(4-(5-trifluorometil-2-piridiloksi)fenoksi)propionat); CAS št.: 79241-46-6; 100 g/l oktan-1-ol; CAS št.: 111-87-5; 150 g/l oleil-poliglikol etra z etilen oksidom; CAS št.: 9004-98-2 in 25 g/l kalcijevega benzen sulfonata; CAS št.: 26264-06-2.*

Xn

ZDRAVJU ŠKODLJIVO

Draži kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Možnost škodovanja nerojenemu otroku.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

N

OKOLJU NEVARNO

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Zastopnik: ***Syngenta Agro, d.o.o.,***
Kržičeva 3, Ljubljana,
tel.: 01/436 12 03
faks: 01/436 12 14

1 l

Skladiščenje:
Sredstvo hranite v suhem in zračnem prostoru, izven dosega otrok, pri temperaturi med -10° in 40°C, ločeno od vnetljivih snovi.

Uporaba:
Uporablja se za zatiranje **enoletnih** in **večletnih ozkolistnih plevelov** razen enoletne latovke *(Poa annua)* v:
a) **poljščinah (sladkorna, rdeča in krmna pesa, soja, sončnice, ozimna oljna ogrščica, krmni grah)** v odmerku:
- 0,8 l/ha (8 ml/100 m²) za zatiranje **enoletnih ozkolistnih plevelov,**
- 1,3 l/ha (13 ml/100 m²) za zatiranje **večletnih ozkolistnih plevelov *(Sorghum halepense)*,** s predhodno medvrstno obdelavo tal, s katero razrežete rizome;
- 1,5-2 l/ha (15-20 ml/100 m²) za zatiranje **večletnih ozkolistnih plevelov *(Cynodon dactylon, Elymus repens).***
b) **vrtninah (krompir, grah, fižol, kapusnice, čebula** (ni za mlado čebulo)**, korenje, paradižnik, paprika** (razen zgodnjih sort) in **rdeča pesa)** v odmerku:
- 0,8 l/ha (8 ml/100 m²) za zatiranje **enoletnih ozkolistnih plevelov,**
- 1,3 l/ha (13 ml/100 m²) za zatiranje **večletnih ozkolistnih plevelov *(Sorghum halepense),*** s predhodno medvrstno obdelavo tal;
- 1,5-2 l/ha (15-20 ml/100 m²) za zatiranje **večletnih ozkolistnih plevelov *(Cynodon dactylon, Elymus repens)***. Ne sme se uporabljati v deljenih odmerkih (split aplikaciji), zaradi podaljšanja perzistentnosti.
c) **sadovnjakih (koščičasto in pečkato sadje, maline, robide,** in **kosmulje)** (samo do pričetka cvetenja)**, vinogradih in drevesnicah okrasnih rastlin** (od prvega leta vzgoje) v odmerku:
- 0,8 l/ha (8 ml/100 m²) za zatiranje **enoletnih ozkolistnih plevelov,**
- 1,3 l/ha (13 ml/100 m²) za zatiranje **večletnih ozkolistnih plevelov *(Sorghum halepense)*,** s predhodno medvrstno obdelavo tal, s katero razrežete rizome;
- 1,5-2 l/ha (15-20 ml/100 m²) za zatiranje **večletnih ozkolistnih plevelov *(Cynodon dactylon, Elymus repens).***
d) **jagodah** v odmerku:
- 0,8 l/ha (8 ml/100 m²) za zatiranje **enoletnih ozkolistnih plevelov,**
- 1,3 l/ha (13 ml na 100 m²) za zatiranje **večletnih ozkolistnih plevelov**.
Škropite pred cvetenjem in po obiranju, s tem, da sredstvo lahko uporabite največ dva krat v eni rastni sezoni;
e) **tobaku** v odmerku:
- 0,8 l/ha (8 ml/100 m²) za zatiranje **enoletnih ozkolistnih plevelov,**
-1,3 l/ha (13 ml/100 m²) za zatiranje **večletnih ozkolistnih plevelov.**
Škropite, ko so pleveli v fazi 2-4 lista, oziroma v fazi intenzivne rasti.

Pri škropljenju uporabite 200-300 l vode na ha (2-3 l vode na 100 m²).

Opozorila:
Sredstva ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu. Na tretiranih površinah 2 meseca po škropljenju s Fusiladom Forte ne smete sejati žit. Pri škropljenju morate obvezno preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da škropite najmanj 20 m od njih. Fusilade Forte lahko uporabite na isti površini samo enkrat letno, ali dvakrat, če ga uporabite v deljenih odmerkih (split aplikaciji).

Fitotoksičnost:
Sredstvo uporabljeno v predpisanih količinah in na ustrezen način, ni fitotoksično za zgoraj omenjene gojene rastline. V stiku s sosednjimi posevki (koruza, žita) lahko deluje fitotoksično.

Mešanje:
Sredstvo lahko mešate s sredstvi na osnovi kloridazona (Pyramin turbo), etofumesata (Nortron), metamitrona (Goltix) in fenmedifama (Betanal), ne smete ga mešati s sredstvi na osnovi in bentazona (Basagran).

Priprava sredstva za uporabo:
Odmerjeno količino sredstva vlijte skozi sito v rezervoar škropilnice, ki je do polovice napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju rezervoar dopolnite z vodo.

Karenca:
28 dni za slive, češnje, pečkato sadje, vinsko trto in čebulo, 30 dni za kumare, najmanj 35 dni za paradižnik, 42 dni za maline, jagode in tobak, 45 dni za ribez in kosmulje, 49 dni za kapusnice, papriko, fižol in grah, 56 dni za korenje in krompir ter najmanj 70 dni za peso in sojo. Za krmni grah, oljno ogrščico in sončnice je karenca zagotovljena s časom uporabe.

Znaki zastrupitve:
Znaki zastrupitve so slabost, utrujenost, znojenje, v primeru zaužitja pa bolečine v ustih, žrelu in predelu želodca, bruhanje,