

**Karate Zeon 5CS vsebuje:** 50 g/l lambda-cihalotrina; (a-ciano-3-fenoksibenzil)-3-(2- kloro-3,3,3-trifluoroprope-  
nil)2,2- metilklopropan karboksilat, zmes (Z)-(1R,3R),  
S-estra in (Z)-(1S,3S), R-estra; CAS št.: 91465-08-6.

**Insekticid v obliki kapsulirane suspenzije (CS) belkaste barve, ki se uporablja za zatiranje škodljivih žuželk v sadjarstvu, vinogradništvu, poljedelstvu in vrtnarstvu.**

X<sub>n</sub>



**ZDRAVJU  
ŠKODLJIVO**

Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Šrupeno za čebele.

N



**OKOLJU  
NEVARNO**

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne vdihavati hlapov. Preprečiti stik s kožo. Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz. Če pride do zaužitja, takoj poiškati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Snov / pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. Ne izpuščati / odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila / varnostni list.

**Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.**

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**,  
Ljubljana, Kržičeva 3,  
tel.: 01/436 12 03, faks: 01/436 12 14

1 |

**Izdaja le na podlagi veljavnega potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine.**

**SKLADIŠČENJE:** v suhem in zračnem prostoru, pri temp. od 5 do 30°C, zaklenjeno in izven dosega otrok.

**V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.**

Odl. št.: **327-02-315/2002/7** z dne **29.10.2003**, št.: **327-02-315/2002/12** z dne **7.7.2004** in št.: **327-02-315/2002/8** je dne **11.10.2004** izdalo MKGP, FURS

**Rok uporabe:** je odtisnjen na embalaži.

**Številka serije:** je odtisnjena na embalaži.

PPE207488

L121461 SLOVI1J

**KARATE** with **ZEON** **5CS**

**Insekticid v obliki kapsulirane suspenzije (CS) belkaste barve, ki se uporablja za zatiranje škodljivih žuželk v sadjarstvu, vinogradništvu, poljedelstvu in vrtnarstvu.**

Proizvajalec: **Syngenta Limited**, Fernhurst, Velika Britanija

© zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

**Pred uporabo obvezno preberite priloženo navodilo za uporabo.**

24 urna dežurna služba,  
tel.: 00 44 1484 538 444  
Syngenta Alarm Center,  
Huddersfield, VB



3 831053 919103



1 |

syngenta



DESCRIPTION:  
1 LITRE CONCERTINA LFLET LABEL\_W

SPECIFICATION No:  
PE 164815

ISSUE DATE:  
07/03

ISSUE No:  
3

**PE 164815**

nice naj bo vključeno tudi ves čas škropljenja.

#### KARENCA:

3 dni za redkvico, papriko, kumare, paradižnik, jajčevce, por in špinačo; 7 dni za breskve, marelice, slive, jagode, rdeči ter črni ribez, kosmulje, zeleno, grah, fižol s stroki in krompir; 14 dni za jabolka in hruške; 15 dni za sladkorno in krmno peso; 21 dni za vinsko trto, pšenico, rž, oves, tritikalo in kapusnice; 28 dni za oljno ogrščico in 30 dni za ječmen.

#### ZNAKI ZASTRUPITVE IN PRVA POMOČ:

V primeru zastrupitve takoj pokličite zdravnika. Ponesrečencu slecite umazano obleko in ga prenesite na svež zrak. V primeru zaužitja sredstva ali pripravljene brozge ne izzivajte bruhanja, temveč takoj pokličite zdravnika. **Protistrupa (antidota) ni.** Nadaljnje zdravljenje je simptomatično. Izpiranje želodca je učinkovito v času do 4 ure po zaužitju. Preprečiti je treba aspiracijo želodčne vsebine v pljuča. Razmislite o dajanju aktivnega oglja in odvajala. Oči spirajte z raztopino za spiranje oči ali mlačno vodo tako, da s palcem in kazalcem razprete veke. Kožo sperite z vodo in milom. Takoj pokličite zdravnika.

#### RAVNANJE V PRIMERU NEZGODE PRI PREVOZU IN V ZAPRTEM PROSTORU:

Takoj obvestite organe javne varnosti, zavarujte mesto nesreče in preprečite nastajanje nadaljnje škode. Ponesrečenim osebam nudite prvo pomoč in pokličite zdravnika. Če je prišlo do razlitja, morate posuti tla z žagovino ali drugim absorb-

tivnim sredstvom in to dati v dobro zaprto posodo. Tla in ostale umazane predmete očistite še z vodo in detergentom. Če pride do požara, gasite vedno le s prahom, CO<sub>2</sub> ali z drugimi kemičnimi sredstvi, le v skrajnem primeru z vodo. Ne uporabljajte vodnih curkov. Pri gorenju se sproščajo strupeni plini, zato je potrebno uporabiti dihalne aparate in zaščitno obleko.

#### RAVNANJE Z OSTANKI SREDSTEV IN PRAZNO EMBALAŽO:

Prazno embalažo, ostanke neporabljenega pripravka ali pripravka, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranite kot nenevaren odpadek skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škroplilno brozgo. Tako očiščeno embalažo brezpravno prepustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.

Odločbo št.: **327-02-315/2002/7** z dne **29.10.2003**; št.: **327-02-315/2002/12** z dne **7.7.2004** in št.: **327-02-315/2002/8** je dne **11.10.2004** izdalo MKGP, Fitosanitarna uprava RS.

**Navodilo za uporabo je takšno, kot ga je odobril pristojni organ.**

#### SPLOŠNE OPOMBE:

Proizvajalec jamči za kakovost pripravka, dokler je v originalni embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja, proizvajalec ne odgovarja.

© zaščitena znamka firme  
Syngenta Group Company

© 2001 Syngenta Crop Protection AG

#### PROIZVAJAJA:

**Syngenta Limited,**  
Fernhurst, Velika Britanija

#### ZASTOPNIK:

**Syngenta Agro d.o.o.,**  
Ljubljana, Kržičeva 3

PPE207488

L121461 SLOV/11



Karate Zeon 5 CS vsebuje: 50 g/l lambda-cihalotrina; (a-ciano-3-fenoksibenzil)-3-(2- kloro-3,3,3-trifluoroprope- nil)2,2- metilkiclopropan karboksilat, zmes (Z)-(1R,3R), S-estra in (Z)-(1S,3S), R-estra); CAS št.: 91465-08-6.

**Insekticid v obliki kapsulirane suspenzije (CS) belkaste barve, ki se uporablja za zatiranje škodljivih žuželk v sadjarstvu, vinogradništvu, poljedelstvu in vrtnarstvu.**

X<sub>n</sub>  
  
**ZDRAVJU ŠKODLJIVO**

Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Strupeno za čebele.

N  
  
**OKOLJU NEVARNO**

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne vdihavati hlapov. Preprečiti stik s kožo. Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Snov / pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. Ne izpuščati / odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila / varnostni list.

**Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.**

Zastopnik: Syngenta Agro d.o.o.,  
Ljubljana, Kržičeva 3  
tel.: 01/436 12 03, faks: 01/436 12 14

11

**SKLADIŠČENJE:** v suhem in zračnem prostoru, pri temp. od 5 do 30°C, zaklenjeno in izven dosega otrok.

**NAČIN DELOVANJA:** Dotikalni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem.

#### UPORABA:

Pripravek uporabljamo za zatiranje številnih škodljivcev na različnih gojenih rastlinah:

##### a) v poljedelstvu:

- **na pšenici, ječmenu, rži, ovsu** in **tritikali** za zatiranje **rdečega žitnega strgača (*Oulema melanopus*)**, **listnih uši (Aphididae)**, in **žitnih stenic (*Eurygaster spp.*)** v odmerku 0,1-0,15 l/ha (1-1,5 ml/10 l vode/100 m<sup>2</sup>).
- **na sladkorni pesi in krmni pesi** za zatiranje **talnih sov (Agrotis spp.)**, **listnih sov (Mamestra spp.)**, **bolhačev (Halticinae)** in **listnih uši (Aphididae)** v odmerku 0,1-0,15 l/ha (1-1,5 ml/10 l vode/100 m<sup>2</sup>).
- **na oljni ogrščici** za zatiranje **repne grizlice (*Athalia rosae*)** v odmerku 0,1-0,13 l/ha (1 do 1,3 ml/10 l vode/100 m<sup>2</sup>), **kljunotaja (*Ceutorhynchus spp.*)**, **repičarja (*Meligethes aeneus*)** in **listnih uši (Aphididae)** v odmerku 0,13 l/ha (1,3 ml/10 l vode/100 m<sup>2</sup>).
- **na krompirju** za zatiranje **listnih uši (Aphididae)** v odmerku 0,1-0,13 l/ha (1-1,3 ml/10 l vode na 100 m<sup>2</sup>).

##### b) v vrtnarstvu:

- **na jajčevcu** za zatiranje **listnih uši (Aphididae)**,

**listnih sov (Mamestra spp.)**, **koloradskega hrošča (*Leptinotarsa decemlineata*)**, in **resarjev (Thripidae)** v odmerku 0,1-0,15 l/ha (1 do 1,5 ml/10 l vode/100 m<sup>2</sup>) in **rastlinjakovega ščitkarja (*Trialeurodes vaporariorum*)** v odmerku 0,2 l/ha (2 ml/10 l vode/100 m<sup>2</sup>).

- **na poru, zeleni, grahu in stročjem fižolu** za zatiranje **listnih uši (Aphididae)**, **listnih sov (Mamestra spp.)** in **resarjev (Thripidae)** v odmerku 0,1-0,15 l/ha (1-1,5 ml/10 l vode na 100 m<sup>2</sup>);
- **na papriki in paradižnik** za zatiranje **listnih uši (Aphididae)**, **listnih sov (Mamestra spp.)**, **koloradskega hrošča (*Leptinotarsa decemlineata*)** v odmerku 0,1-0,15 l/ha (1-1,5 ml/10 l vode/100 m<sup>2</sup>) in **rastlinjakovega ščitkarja (*Trialeurodes vaporariorum*)** v odmerku 0,2 l/ha (2 ml/10 l vode/100 m<sup>2</sup>).
- **na brstičnem ohrovtu in zelju** za zatiranje **kapusovega molja (*Plutella xylostella*)**, **mokaste kapusove uši (*Brevicoryne brassicae*)**, **kapusovega belina (*Pieris brassicae*)**, **kapusove sovke (*Mamestra brassicae*)**, **zelenjadne sovke (*Lacanobia oleracea*)**, **listnih uši (Aphididae)** in **resarjev (Thripidae)** v odmerku od 0,15 do 0,2 l/ha (1,5-2 ml/10 l vode/100 m<sup>2</sup>) in **rastlinjakovega ščitkarja (*Trialeurodes vaporariorum*)** v odmerku 0,2 l/ha (2 ml/10 l vode na 100 m<sup>2</sup>).
- **na redkvici in špinaci** za zatiranje **listnih uši (Aphididae)** in **resarjev (Thripidae)** v odmerku 0,15-0,20 l/ha (1,5-2 ml/10 l vode na 100 m<sup>2</sup>) in **rastlinjakovega ščitkarja (*Trialeurodes vaporariorum*)** v odmerku 0,2 l/ha

(2 ml na 10 l vode/100 m<sup>2</sup>).

- **na kumarah** za zatiranje **listnih uši (Aphididae)**, **listnih sov (Mamestra spp.)**, **resarjev (Thripidae)** v odmerku 0,1-0,15 l/ha (1-1,5 ml na 10 l vode/100 m<sup>2</sup>) in **rastlinjakovega ščitkarja (*Trialeurodes vaporariorum*)** v odmerku 0,2 l/ha (2 ml/10 l vode/100 m<sup>2</sup>).
- c) **na rdečem in črnem ribezu, kosmuljah in jagodah** za zatiranje **listnih uši (Aphididae)** v odmerku 0,1-0,15 l/ha (1-1,5 ml/10 l vode na 100 m<sup>2</sup>).
- d) **v sadjarstvu**
  - **na jablanah in hruškah** za zatiranje **jabolčnega zavijača (*Cydia pomonella*)** in **listnih zavrtčev (Lyonetiidae)** v odmerku 0,1 l/ha oz. v 0,01% konc. (1 ml/10 l vode), **navadne hruševe bolšice (*Cacopsylla pyri*)** v odmerku 0,15-0,20 l/ha (1,5-2 ml/10 l vode) in **listnih uši (Aphididae)** v odmerku 0,1-0,13 l/ha oz. v 0,01 do 0,013% konc. (1-1,3 ml/10 l vode).
  - **na breskvah, marelicah in slivah** za zatiranje **breskovega zavijača (*Cydia molesta*)** in **breskovega molja (*Anarsia lineatella*)** v odmerku 0,2 l/ha oz. v 0,02% konc. (2 ml/10 l vode), **češpljevega zavijača (*Cydia funebrana*)** v odmerku 0,15 l/ha oz. v 0,015% konc. (1,5 ml na 10 l vode), in **listnih uši (Aphididae)** v odmerku 0,1-0,13 l/ha oz. v 0,01-0,013% konc. (1-1,3 ml/10 l vode).
- f) **na vinski trti** za zatiranje **križastega grozdnega sukača (*Lobesia botrana*)** in **pasastega grozd-**

**nega sukača (*Eupoecilia ambiguella*)** v odmerku 0,1-0,15 l/ha oz. v 0,01-0,015% konc. (1-1,5 ml/10 l vode).

#### OPOZORILA:

Pri škropljenju morate preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov s tem, da škropite najmanj 20 m od njih. Sredstva ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu! Karate Zeon 5 CS lahko uporabite na isti površini oziroma istem nasadu največ dvakrat letno. Pripravek je močno strupen za čebele, zato se s pripravkom sadnega drevja ne sme tretirati v času cvetenja sadnega drevja ali podrast, če ni pokošena. V primeru uporabe pripravka na poljščinah in zelenjavi na večjih površinah, je treba o času tretiranja obvestiti okoliške čebelarje, da čebele začasno zaprejo in jih pred novim izpustom dobro napojijo.

#### FITOTOKSIČNOST:

Če pripravek uporabljamo v predpisanih količinah in na ustrezen način, ne povzroča poškodb na gojenih rastlinah, za katere je namenjen.

#### MEŠANJE:

Sredstva ne smemo mešati z bordojsko brozgo in alkalnimi sredstvi.

#### PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO:

Odmerjeno količino sredstva vlijte skozi sito v rezervoar škropilnice, ki je do polovice napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju dopolnite rezervoar z vodo do potrebne količine. Mešalo škropil-