

PPE207979

L121956 SLOV1J

MATCH® 050EC

**Koncentrat za emulzijo (EC).
Insekticid za zatiranje nekaterih
škodljivcev na sadnem drevju,
vinski trti, krompirju, vrtninah in
okrasnih rastlinah.**

Proizvajalec:
**Syngenta Crop Protection AG,
Basel, Švica**

® zaščiten znak firme Syngenta Group Company

Prodaja je dovoljena samo v izvorni embalaži.

24 urna dežurna služba, tel.: 00 44 1484 538 444
Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, VB



1 |

syngenta

MATCH® 050 EC

PPE207979
L121956 SLOV/1J

Match 050 EC vsebuje: 50g/l lufenurona; (RS)-1-[2,5-dikloro-4-(1,1,2,3,3,3-heksafluoro-propoksi)-fenil]-3-(2,6-difluorobenzoil)-urea, CAS št.: 103055-07-7; 590 g/l aromatskih ogljikovodikov, CAS št.: 64742-94-5; 200g/l cikloheksanona, CAS št.: 108-94-1.

Koncentrat za emulzijo (EC). Insekticid za zatiranje nekaterih škodljivcev na sadnem drevju, vinski trti, krompirju, vrtninah in okrasnih rastlinah.



Vnetljivo. Draži oči in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

Zaradi varovanja zdravlja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

11

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01/436 12 03, faks: 01/436 12 14

Izdaja le na podlagi veljavnega potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine.

Skladiščenje: v originalni, zaprti embalaži, zaščiteno pred soncem in vlago, nedostopno otrokom, nepoučenim osebam in živini, ločeno od hrane, pijače in krmil, v zračnem prostoru, pri temperaturi med -5°C in +35°C.

Odločbo št.: **32702167/99** je dne 13.6.2001 izdalo MKGP, Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo.

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je opisano v priloženem navodilu za uporabo.

Rok uporabe in številka šarže sta odtisnjena na embalaži.

MATCH® 050 EC

PPE207979
L121956 SLOV11J

Match 050 EC vsebuje: 50g/l lufenurona; (RS)-1-[2,5-dikloro-4-(1,1,2,3,3,3-heksafluoro-propoksi)-fenil]-3-(2,6-difluorobenzoil)-urea, CAS št.: 103055-07-7; 590 g/l aromatskih ogljikovodikov, CAS št.: 64742-94-5; 200g/l cikloheksanona, CAS št.: 108-94-1.

Koncentrat za emulzijo (EC). Insekticid za zatiranje nekaterih škodljivcev na sadnem drevju, vinski trti, krompirju, vrtninah in okrasnih rastlinah.



Vnetljivo. Draži oči in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

11

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01/436 12 03, faks: 01/436 12 14

zdaja le na podlagi veljavnega potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine.

Skladiščenje: v originalni, zaprti embalaži, zaščiteno pred soncem in vlago, nedostopno otrokom, nepoučenim osebam in živini, ločeno od hrane, pijače in krmil, v zravnem prostoru, pri temperaturi med -5°C in +35°C.

Odločbo št.: 32702167/99 je dne 13.6.2001 izdalo MKGP, Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo.

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je opisano v priloženem navodilu za uporabo.

Rok uporabe in številka šarže sta odtisnjena na embalaži.

2

SKLADIŠČENJE:

Pripravek hranite v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred soncem in vlago, pod ključem, nedosegljivo otrokom, nepoučenim osebam in živini, ločeno od hrane, pijače in krmil, v dobro prezračenem prostoru, pri temperaturah med -5°C in +35°C. Odprt pripravek se mora porabiti v nekaj dneh.

DELOVANJE IN UPORABA:

Match 050 EC je ovo-larvicid, ki deluje kot inhibitor biosinteze hitina in tako preprečuje formiranje kutikule, je nesistemični regulator rasti insektov, ki deluje močno preko prebavil in rahlo kontaktno. Deluje na insekte, ki so rezistentni na tradicionalne insekticide. Uporabljate ga lahko za zatiranje naslednjih insektov:

a) na jablanah: jablanovega zavijača (*Cydia pomonella*), sadnega listnega duplinarja (*Leucoptera malifoliella*), zavijače (*Tortricidae*).

b) na hruškah: navadne hruševe bolšice (*Cacopsylla pyri*).

c) na vinski trti: pasastega grozdnega sukača (*Eupoecilia ambiguella*), križastega grozdnega sukača (*Lobesia botrana*).

d) na breskvah: breskovega zavijača (*Cydia molesta*)

Škropite v odmerku 1 l/ha, oz. 0,1% konc. (10 ml/100 m²) na jablanah in breskvah v času odlaganja jajčec do pojava prvih ličink, na hruškah in na vinski trti pa ob pojavu prvih ličink.

e) na krompirju: koloradskega hrošča (*Leptinotarsa decemlineata*) v odmerku 0,3 l/ha (3 ml na 100 m² v 3-6 l vode) v razvojnem stadiju L1-L3.

e) na zelju: kapusovega belina (*Pieris brassicae*), kapusove sovke (*Mamestra brassicae*) v odmerku 0,4 l/ha (4 ml/100 m²/3-6 l vode), ob pojavu jajčec, največ 1-krat v rastni sezoni.

f) na papriki: resarjev (*Frankliniella spp.*), v odmerku 2 l/ha (20ml/100 m²), 3-krat v eni rastni dobi, v razmaku 7-14 dni; koruzne ali prosene večje (*Ostrinia nubilalis*), v odmerku 2 l na ha (20 ml/100 m²), 1-krat v rastni dobi; sovk (*Heliothes spp.*) v odmerku 1 l/ha (10 ml / 100 m²), 1-krat v rastni dobi, ob pojavu jajčec.

g) na jajčevcih: resarjev (*Frankliniella spp.*) v odmerku 2 l/ha (20 ml/100 m²), 2-krat v rastni dobi, v razmaku 7-14 dni, ob pojavu jajčec; koloradskega hrošča (*Leptinotarsa decemlineata*)

3

v odmerku 0,4 l/ha (4 ml/100 m²) 1-krat v rastni dobi; **sovč (*Heliotis armigera*)** v odmerku 0,6 l/ha (6 ml/100 m²), 1-krat v rastni dobi, ob pojavu jajčec.

h) na paradižniku: resarjev (*Frankliniella* spp.) v odmerku 2 l/ha (20 ml/100 m²), 2-krat v rastni dobi, v razmaku 7-14 dni, in **sovč (*Heliothes* spp.)** v odmerku 0,6 l/ha (6 ml/100 m²), 1-krat v rastni dobi, ob pojavu jajčec.

i) na okrasnih rastlinah: resarjev (*Frankliniella* spp.) v odmerku 2 l/ha (20 ml/100 m²), v času vegetacije, v razmakih 7-14 dni.

NAČIN UPORABE:

Temeljito poškopite celotno rastlino. Pazite, da ne boste z večkratnim škropljenjem istega predela rastline povečali doze. Ne škropite sosednjih površin. Ne škropite v zelo vročem vremenu ali če pričakujete padavine.

VAROVANJE OKOLJA:

Pripravek je strupen za vodne organizme, zato morate preprečiti, da bi se z njim onesnažile tekoče in stoječe vode in vodni izviri. Nasadi oziroma posevki, ki jih škropite, morajo biti najmanj 20 m oddaljeni od voda. Ker je pripravek strupen za čebele, z njim ne smete škropiti v času, ko čebele aktivno nabirajo med. Pazite, da na sveže poškopljeno površino ne zaide živina.

FITOTOKSIČNOST (OBČUTLJIVOST RASTLIN):

Če se uporablja tako kot svetujemo, vse rastline pripravek dobro prenašajo. V primeru dvoma ali pri novih varietetah svetujemo izvedbo testa občutljivosti rastlin.

MEŠANJE Z DRUGIMI PRIPRAVKI (KOMPATIBILNOST):

Match 050 EC se lahko meša z večino standardnih insekticidov in fungicidov razen z alkalnimi (žvepleno apno, baker). Če dvomite v sposobnost mešanja, svetujemo manjši test mešanja.

PRIPRAVA ŠKROPILNE BROZGE:

Tank škropilnice do polovice napolnite z vodo in dodajte odmerjeno količino sredstva. Med stal-

nim mešanjem dodajte še preostalo vodo. Ne pripravljajte več mešanice, kot je boste potrebovali, da vam ne bo ostajala. Pripravljeno mešanico porabite v nekaj urah.

KARENCA:

za breskve 35 dni, za jabolka, hruške, vinsko trto 28 dni, za krompir 21 dni, za zelje 14 dni, za papriko, jajčevce in paradižnik 7 dni.

ZNAKI ZASTRUPITVE:

Znaki zastrupitve pri človeku niso znani. V laboratorijskih pogojih so pri podganah ugotovili nespecifične znake zastrupitve. V primeru slabosti pri delu s pripravkom je treba prizadetemu nuditi prvo pomoč.

PRVA POMOČ:

Splošni ukrepi: prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja v dobro prezračen prostor ali na svež zrak in jo zavarujte pred mrazom. Zagotovite osnovne življenjske funkcije in se takoj posvetujte z zdravnikom ter mu posredujte podatke o pripravku, ki so na originalni embalaži in v navodilu za njegovo uporabo.

V primeru stika s kožo: odstranite kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijte z vodo in milom.

V primeru stika z očmi: oči temeljito sperite s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom.

V primeru vdihavanja: pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnosti za zdravje. Pri vdihavanju večje količine razpršenih delcev se ravnajte po splošnih navodilih.

V primeru zaužitja: ne izzivajte bruhanja, ker vsebuje pripravek relativno visok odstotek organskih topil in bi lahko prišlo do aspiracije želodčne vsebine. Prisebna oseba naj popije aktivno oglje, razredčeno z vodo.

Osebi z moteno zavestjo ne smete dati ničesar piti, niti ne izzivati bruhanja.

NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ:

Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju pripravka dajte prisebni osebi aktivno oglje 1 g/kg telesne teže, razredčenega z vodo v razmerju 1:4. V primeru zaužitja večje količine pripravka je v prvih urah indicirano izpiranje želodca.

Specifičnega protistrupa ni. Zdraviti je treba po znakih obolenja. Zaradi nevarnosti aritmij se izogibajte uporabe adrenalina in drugih simpatomimetičnih aminov.

VARNOSTNI UKREPI V PRIMERU NEZGODE:

V zaprtem prostoru: Če se poškoduje embalaža in se pripravek razlije, ga morate ob uporabi osebnih zaščitnih sredstev posipati z vpojnim materialom (pesek, žagovina, zemlja, ...), vse skupaj pobrati in spraviti v posebno, za to določeno in označeno posodo. Vse skupaj predajte v uničenje podjetju, ki se ukvarja z uničevanjem industrijskih odpadkov. Tla očistite z veliko količino vode. V primeru požara gasite s prahom, peno, CO₂ ali razpršeno vodo.

Pri prevozu: Ugasnite motor avtomobila in ne kadite. Zavarujte mesto nezgode in nanjo opozorite ostale udeležence v prometu ter obvestite Center za obveščanje na tel. št.: 112. Nato ukrepajte kot je navedeno zgoraj.

POSTOPEK Z OSTANKOM PRIPRAVKA IN PRAZNO EMBALAŽO:

Prazno embalažo, ostanke neporabljenega pripravka ali pripravka, ki mu je potekel rok uporabnosti, morate oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranite kot nenevaren odpadek skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo brezplačno prepustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.

Odločbo št.: **32702167/99** je dne **13.6.2001** izdalo MKGP, Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo.

Navodilo za uporabo je takšno, kot ga je odobril pristojni organ.

Proizvajalec jamči za kakovost pripravka, dokler se prodaja v izvorno zaprti embalaži. Za škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega shranjevanja pripravka, proizvajalec ne odgovarja.

® zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

© 2001 Syngenta Crop Protection AG

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica

Zastopnik:

Syngenta Agro d.o.o., Ljubljana, Kržičeva 3

tel.: 01/436 12 03

faks: 01/436 12 14