

Maxim XL

035 FS

PPE174778
L112970 CROAI8H



Maxim XL 035 FS vsebuje: 25 g/l fludioksonila; 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-il)-1H-pirol-3-karbonitril; CAS št.: 131341-86-1; 10g/l metalaksil-M-a; N-(2,6-dimetilfenil)-N-(metoksiacetil)-D-alanin metil ester; CAS št.: 70630-17-0;

Fungicid za vlažno razkuževanje semena koruze v obliki koncentrata rdeče barve.

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

20 l

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01/436 12 03; faks: 01/436 12 14

Izdaja le na podlagi potrdila iz fitomedicine.

Skladiščenje: v originalni, zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, zavarovano pred soncem in vlago, pri temperaturah od 0 do +35°C, nedostopno otrokom, nepoučenim osebam in živalim.

Razkuženo seme mora biti pravilno posejano in popolnoma pokrito z zemljo, ne sme se uporabljati kot hrana za ljudi, ptice in druge živali! Obvezno je treba preprečiti onesnaženje voda s pripravkom.

Odločbo št.: **3270251/00** z dne **24.2.2001** in spremembo odločbe št.: **32702297/01** je dne **9.10.2001** izdalo MKGP, Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo.

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.

Rok uporabe in številka šarže sta odtisnjena na embalaži.

24 urna dežurna služba, tel.: 0044 1484 538 444,
Syngenta Alarm Center, Huddersfield, Velika Britanija

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG,
Basel, Švica

© zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

20 l

syngenta



SKLADIŠČENJE:

Pripravek hranite v originalno zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, zavarovano pred soncem in vlago, pri temperaturah višjih od 0 in nižjih od +35°C, nedostopno otrokom, nepoučenim osebam in domačim živalim. Pripravka ne hranite skupaj z živili, pijačami in krmili.

DELOVANJE IN UPORABA:

Maxim XL 035 FS je kontaktni fungicid, ki se uporablja za razkuževanje **semena koruze** proti naslednjim boleznim: **fuzariozam (*Fusarium spp.*)** in **padavici (*Pythium spp.*)** v odmerku 100 ml/100 kg semena. Uporabljate lahko nerazredčen pripravek ali pripravek razredčen z vodo v razmerju 1 del pripravka na 7 do 11 delov vode. Mešanico pripravka in vode porabite v 24 urah. V primeru, da uporabite več vode, morate med celotnim postopkom aplikacije mešanico intenzivno mešati. Seme koruze lahko razkužujete v aparatih za vlažno razkuževanje semena, ki so predhodno kalibrirani za uporabo Maxima XL 035 FS.

VAROVANJE OKOLJA:

Pri uporabi pripravka se obvezno ravnajte po navodilu za uporabo. Razkuženega semena ne smete uporabljati za prehrano ljudi, rib, ptic in drugih živali, kakor tudi ne za industrijsko predelavo. Pri tretiranju morate preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jezer, morja in vodnih izvirov tako, da tretirate najmanj 20 m od njih. Razkuženo seme je treba pravilno posejati, da je v celoti pokrito z zemljo.

FITOTOKSIČNOST (OBČUTLJIVOST GOJENIH RASTLIN):

Pripravek ne bo negativno vplival na kalivost semena koruze, če ga boste uporabili, kot priporočamo.

KOMPATIBILNOST (MEŠANJE Z DRUGIMI PRIPRAVKI):

Maxim XL 035 FS se lahko meša z drugimi pripravki za razkuževanje semena koruze, ki so v obliki koncentratov za suspenzijo ali tekočih koncentratov in imajo nevtralno reakcijo.

KARENCA:

Zagotovljena je s časom uporabe.

ZASTRUPITEV, PRVA POMOČ IN ZDRAVLJENJE:

Zastrupitve pri ljudeh niso znane, tudi znaki zastrupitev ne.

PRVA POMOČ:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega prostora na svež zrak oziroma v dobro zračen prostor in jo zavarujte pred mrazom. Zagotovite osnovne življenjske funkcije. Takoj se posvetujte z zdravnikom in mu posredujte podatke o pripravku, ki so na originalni embalaži in/ali v navodilu za uporabo pripravka.

Pri vdihavanju hlapov: Pri pravilni uporabi ni pričakovati nevarnosti za zdravje. Ravnajte se po splošnih navodilih.

Pri stiku s kožo: Odstranite kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijte z vodo in milom.

Pri stiku z očmi: Če pride pripravek v oči, jih temeljito izperite (10 minut) s čisto vodo in se po potrebi posvetujte z zdravnikom.

Pri zaužitju: Ne izzivajte bruhanja, takoj pokličite zdravnika. Osebi z moteno zavestjo ne smete dati ničesar piti, niti ne izzivati bruhanja.

Nujna zdravniška pomoč: V primeru zaužitja pripravka dajte prisebni osebi aktivno oglje 1 g/kg telesne teže, razredčenega z vodo v razmerju 1:4. Pri zaužitju večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca.

Specifičnega antidota ni. Nadaljevanje zdravljenja je simptomatično.

UKREPI PRI NEZGODI:

V zaprtem prostoru:

Če se poškoduje embalaža in se pripravek razlije, ga je treba posipati s sredstvom, ki vpija tekočino (zemlja, pesek, žagovina), vse skupaj pobrati in spraviti v posebno, za to določeno in označeno posodo. Vsebinske posode oddajte v uničenje podjetju, ki se ukvarja z uničevanjem industrijskih odpadkov. Tla očistite z vodo in detergentom ali raztopino sode. Pri tem delu uporabljajte osebna zaščitna sredstva. V primeru požara gasite s prahom, peno, CO₂ ali razpršeno vodo.

Pri prevozu: Zavarujte mesto nezgode, opozorite nanjo ostale udeležence v prometu in pokličite policijo. Preprečite, da bi razlita tekočina odtekla v kanalizacijo ali druge vodne poti s posipanjem z zemljo, z drugim primernim sredstvom ali z nasipom. Poberite raztresen pripravek in dalje ukrepajte, kot je navedeno zgoraj.

POSTOPEK Z OSTANKOM PRIPRAVKAIN S PRAZNO EMBALAŽO:

Prazno embalažo, ostanke neporabljenega pripravka ali pripravka, ki mu je potekel rok uporabnosti, morate oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

Odločbo št.: **3270251/00** z dne **24.2.2001** in spremembo odločbe št.: **32702297/01** je dne **9.10.2001** izdalo MKGP. Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo.

Navodilo za uporabo je takšno, kot ga je odobril pristojni organ.

OBSEG JAMSTVA:

Proizvajalec jamči za kakovost pripravka, dokler se prodaja v izvirno zaprti embalaži. Za škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega shranjevanja pripravka, proizvajalec ne odgovarja.

® zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

© Syngenta Crop Protection AG

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica

Zastopnik:

Syngenta Agro d.o.o., Ljubljana, Kržičeva 3