

Peak[®] 75 WG

Peak 75 WG vsebuje: 750g/kg prosulfurona; 1-(4-metoksi-6-metil-triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropil)-fenilsulfonil]-sečnina; CAS št.: 94125-34-5; in 40 g/kg Tinovetin B; CAS št.: 25417-20-3.

Peak 75 WG je selektivni herbicid širokega spektra v obliki vodotopnih zrnec (WG), ki se uporablja za zatiranje širokolistnega plevela v koruzi.

X_n



**ZDRAVJU
ŠKODLJIVO**

N



**OKOLJU
NEVARNO**

Zdravju škodljivo pri zaužitju. Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dogotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijske in krmil. Nositi primerne zaščitne rokavice. Če pride do zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila / varnostni list.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**,
Ljubljana, Kržičeva 3, Ljubljana,
tel.: 01/ 436 12 03; faks: 01/436 12 14

Hranite v originalni, tesno zaprti posodi, v zračnem in suhem prostoru, zaščiteno pred soncem, zaklenjeno, na temp. med -10 in +35 °C.

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.

Odločbo št.: 327-02-134/2004/5 je dne 30. 1. 2006 izdalo MKGP, Fitosanitarna uprava RS

Rok uporabe in številka šarže sta odtisnjena na embalaži.

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG, Basel Švica

® zaščitena znamka firme Syngenta Group Company



20 x 20 g

syngenta

Peak[®] 75 WG

Skladiščenje:

Pripravek hranite v originalni, tesno zaprti posodi, v zračnem in suhem prostoru, zaščiteno pred soncem, ločeno od hrane, pijače in krmil, zaklenjeno, na temp. med -10 in +35 °C.

Način delovanja:

Peak 75 WG je selektivni herbicid za zatiranje širokolistnega plevela v koruzi. Aktivna snov prosulfuron se absorbira tako preko listov kot preko korenin plevela in inhibira encim acetolaktat sitazo (ALS). Pleveli zaradi pomanjkanja hranil propadejo v 5 do 10 dneh.

Uporaba:

Peak 75 WG se uporablja po vzniku za zatiranje **enoletnega širokolistnega plevela v koruzi**. Odlično deluje tudi na **kislíce (*Rumex spp.*)** in dobro na **njivski osat (*Cirsium arvense*)**.

Ne priporoča se uporaba v inbridiranih linijah.

Odmerek:

20-30 g/ha (0,2-0,3 g/100 m²) z dodatkom močila, npr. extravon 300 ml/ha (3ml/100m²).

Čas uporabe:

Po vzniku, ko ima koruza največ 7 listov in pleveli 6 listov.

Način uporabe: Peak 75 WG škropite s škropilnicami, ki se navadno uporabljajo za tretiranje s herbicidi z zmanjšano ali navadno količino vode (200-400 L/ha). Škropilno brozgo dobro premešajte in enakomerno porazdelite po površini. Za tretiranje priporočamo uporabo pahljačastih šob. Isto površino smete z Peakom 75 WG tretirati samo enkrat v istem letu.

Kolobar:

Jeseni lahko sejete ozimna žita in oljno ogrščico, spomladi pa vse ostale kulture razen sladkorne pese in sončnic, ki jih lahko sejete šele več kot 12 mesecev po tretiranju s Peakom 75 WG. Pred setvijo navedenih poljščin je treba njivo preorati.

Varovanje okolja:

Pri uporabi pripravka se obvezno ravnajte po navodilu. Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevate predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda. Pazita, da živina in druge domače živali ne zaidejo na sveže tretirano površino.

Fitotoksičnost:

V normalnih razmerah različne sorte in hibridne linije koruze dobro prenašajo sredstvo. Pri uporabi na novih hibridih se posvetujte s prodajalcem ali zastopnikom. Peak 75 WG deluje selektivno, če so razmere za rast koruze ugodne (ne prehladno vreme, zadostna talna vlaga) in če pravočasno škropite. Ne smete škropiti posevka, ki ga je poškodovala suša ali druge ujme. Če je treba iz katerega koli razloga predčasno preo-

rati posevke, smete na tej površini čez 4 tedne sejati samo koruzo ali sirek. Zaradi možnega pojava fitotoksičnosti se ne priporoča uporaba prosulfurona v primerih, kjer je bil predhodno apliciran organofosforni insekticid.

Opozorila:

Zaradi možnega pojava odpornosti plevla na aktivno snov prosulfuron se priporoča uporaba herbicidov z različnim načinom delovanja.

Možnost mešanja z drugimi pripravki:

O možnosti mešanja z drugimi herbicidi, zlasti tistimi, ki delujejo skozi korenine, po prej vprašajte proizvajalca. Ne tretirajte skupaj z organofosfornimi insekticidi.

Priprava škropilne brozge:

Peak 75 WG je zrnat koncentrat za suspenzijo in je v prodaji v vodotopnih vrečkah. Rezervoar škropilnice napolnite z vodo do 1/4 predvidene količine, dodajte potrebno količino sredstva in potrebno količino močila, in nato dopolnite rezervoar z vodo. Mešalo mora biti vključeno med pripravljanjem škropilne brozge in med tretiranjem. Škropilno brozgo uporabite v 24 urah, ker bi se njena učinkovitost zaradi razkroja lahko zmanjšala. Po tretiranju škropilnico in ves pribor dobro očistite, najprej z vodo, nato z natrijevim hipokloridom (5.2%) 0.5 L /100 L vode in nato večkrat izplaknite s čisto vodo.

Karenca:

Zagotovljena je s časom uporabe.

Zastrupitve, prva pomoč in zdravljenje:

Zastrupitve pri ljudeh niso znane, tudi znaki zastrupitev ne.

Prva pomoč: Če posumite na zastrupitev, takoj prenehajte z delom in pokličite zdravnika. Pri posvetu z njim imejte pri sebi navodilo za uporabo pripravka. Ponesrečenco do prihoda zdravnika nudite prvo pomoč.

Splošni ukrepi: V kontaminiran prostor vstopite le ustrezno zaščiteni. Prizadetega umaknite iz kontaminiranega v dobro prezračen prostor ali na prosto. Po potrebi ga zaščitite pred mrazom. Prizadeti mora mirovati. Posvetujte se z zdravnikom.

Pri stiku s kožo: Odstranite kontaminirano obleko. Temeljito izperite prizadeti del kože z vodo in milnico. Posvetujte se z zdravnikom.

Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem razprite očesni vekci in izperite oči s čisto vodo. Posvetujte se z zdravnikom.

Pri vdihavanju hlapov: ravnajte po splošnih ukrepih.

Pri zaužitju: Usta sperite z vodo, ponesrečenec naj popije 2-3 dl vode. Ne izzivajte bruhanja. Nezavestnemu ne dajte ničesar piti niti ne izzivajte bruhanja, namestite ga v bočni položaj.

Nujna zdravniška pomoč: Vzpostavite in vzdržujte osnovne življenjske funkcije.

Specifični antidot ni znan. Zdravljenje je simptomatično.

Nadaljevanje zdravljenja: Nadaljujte z vzdrževanjem in skrbnim nadzorom vitalnih funkcij. Izvedite dekontaminacijo kože in oči, v kolikor le-ta še ni bila napravljena. Pri oralni zastrupitvi je indicirana lavaža želodca z aplikacijo aktivnega oglja in saliničnega odvajala.

Ukrepi pri nezgodi:

V zaprtem prostoru: Če se poškoduje embalaža in se pripravek raztrese, ga poberite in spravite v posebno za to določeno in označeno posodo. Vsebinsko te posode predajte v zbirnik posebnih odpadkov pri prodajalcu ali pa v uničenje podjetju, ki se ukvarja z uničevanjem industrijskih odpadkov. Tla očistite z vodo in detergentom ali raztopino sode. Pri tem delu uporabljajte osebna zaščitna sredstva. V primeru požara gasite s

prahom, peno, CO₂ ali razpršeno vodo.

Pri prevozu: Zavarujte mesto nezgode, opozorite nanjo ostale udeležence v prometu in pokličite Center za obveščanje na tel. št.: 112. Poberite raztresen pripravek in dalje ukrepajte, kot je navedeno zgoraj.

Postopek z ostanikom pripravka in prazno embalažo:

Prazno embalažo, ostanke neporabljenega pripravka ali pripravka, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

Popolnoma izpraznjeno embalažo lahko odstranite kot nenevaren odpadek skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tako očiščeno embalažo brezplačno prepustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.

Odločbo št.: **327-02-134/2004/5** je dne **30. 1. 2006** izdalo MKGP, Fitosanitarna uprava RS

Navodilo za uporabo je takšno, kot ga je odobril pristojni organ.

Opozorilo:

Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler se prodaja v izvorno zaprti embalaži. Za škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega shranjevanja sredstva, proizvajalec ne odgovarja.

® zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

© 2004 Syngenta Crop Protection AG

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG, Basel Švica

Zastopnik:

Syngenta Agro d.o.o., Ljubljana, Kržičeva 3

Tel.: 01/436 12 03

Faks: 01/436 12 14