



**Quadris vsebuje:** 250 g/l azoksistrobina: {metil(E)-2-{2-[6-(2-cianofenoksi) pirimidin-4-iloksi]fenil} 3-metoksiakrilat, CAS št.: 131860-33-8; in 120 g/l propilenglikola; CAS št.: 57-55-6.

**Fungicid v obliki koncentrirane suspenzije (SC) svetlo okrase barve za zatiranje boleznih na vinski trti, vrtninah, jagodah in okrasnih rastlinah.**

**Xi**  Draži oči. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

**DRAŽILNO** Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik z očmi. Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Snov / pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov. Ne izpuščati / odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila / varnostni list.

**N**  Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

**OKOLJU NEVARNO** Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Kržičeva 3, Ljubljana tel.: 01/436 12 03 faks: 01/436 12 14

1 |

**Izdaja le na podlagi veljavnega potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine.**

**Skladiščenje:** Pripravek hranite v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred soncem in vlago, v dobro prezračenem prostoru, na temperaturi med +5 in +25°C.

**V primeru zastupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v navodilu za uporabo.**

Odločbo št.: **32702245/00** z dne **21.01.2003** in spremembo odločbe št.: **327-02-245/00/3** je dne **22.7.2004** izdalo MKGP, Fitosanitarna uprava RS.

**Rok uporabe in številka šarže** sta odtisnjena na embalaži.

**Način uporabe:** Pred uporabo je treba pripravek zmešati z vodo po navodilu.

PPE208015

L121942 SLOV11J

**Quadris** 

**Fungicid v obliki koncentrirane suspenzije (SC) bež barve za zatiranje boleznih na vinski trti, vrtninah, jagodah in okrasnih rastlinah.**

Proizvajalec:

**Syngenta Limited, Fernhurst, Velika Britanija**

**Pred uporabo obvezno preberite navodilo za uporabo!**

24 urna dežurna služba, tel.: 00 44 1484 538 444,  
Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Velika Britanija

© zaščitni znak firme Syngenta Group Company



3 831053 986105



1 |

**syngenta**

## POZOR:

Osebam z motnjo zavesti ne smete dati ničesar piti, niti ne smete izzivati bruhanja.

## NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ:

Zagotovite in vzdržujte osnovne življenjske funkcije. V primeru zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca, aplikacija aktivnega oglja in salinичnega odvajala. Zdravljenje je simptomatično.

## RAVNANJE V PRIMERU NEZGODE:

V primeru nezgode morate uporabiti vso predpisano zaščitno opremo, zavarovati mesto nesreče in obvestiti pooblaščenega osebe.

V zaprtem prostoru: dajte poškodovano embalažo v posebej označeno večjo embalažo, po razlitem sredstvu potrebite vpojni material (pesek, zemljo, žaganje). Absorbirani pripravek zberite v ustrezne in posebej označene posode, ki jih oddajte v zbirnik posebnih odpadkov pri vašem prodajalcu oziroma pooblaščenemu podjetju za uničevanje

8

nevarnih industrijskih odpadkov. Tla in umazane predmete očistite še z vodo in detergentom. Večje količine vode za izpiranje zberite v posode, da preprečite onesnaženje odtočnih kanalov, stoječih in tekočih voda.

Na odprtem prostoru: postopajte kot v zaprtem prostoru. Pri razlitju večje količine sredstva odstranite tudi vrhno plast zemlje.

Pri nezgodi med prevozom zavarujte mesto nesreče, preprečite nastajanje nadaljne škode in obvestite policijsko postajo. Sicer ravnajte kot pri razlitju v zaprtem prostoru.

V primeru požara gasite s prahom, peno, CO<sub>2</sub> ali drugimi kemičnimi sredstvi, le izjemoma gasite z vodo. Pri gorenju se sproščajo strupeni plini, zato morate uporabiti dihalne aparate in zaščitno obleko.

## RAVNANJE Z OSTANKI SREDSTEV IN PRAZNO EMBALAŽO:

Prazno embalažo in ostanke neuporabljene pripravke ali pripravka, ki mu je potekel rok uporabnosti, morate oddati

9

pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranite kot nenevaren odpadki skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo brezplačno prepustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.

Odločbo št.: **32702245/00** z dne **21.1.2003** in spremembo odločbe št.: **327-02-245/00/3** je dne **22.7.2004** izdalo MKGP, Fitosanitarna uprava RS.

10

## Navodilo je takšno, kot ga je odobril pristojni organ.

Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v originalni embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja proizvajalec ne odgovarja.

® zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

© Syngenta Crop Protection AG

PROIZVAJAJA:

**Syngenta Limited,**  
Fernhurst, Velika Britanija

ZASTOPNIK:

**Syngenta Agro d.o.o.,**  
Ljubljana, Kržičeva 3  
tel.: 01/436 12 03  
faks: 01/436 12 14

PPE208015

L121942 SLOV1/11

# Quadris®

**Quadris vsebuje:** 250 g/l azoksistrobina; metil(E)-2-{2-[6-(2-cianofenoksi)pirimidin-4-iloksi]fenil}3-metoksiakrilat, CAS št.: 131860-33-8; in 120 g/l propilenglikola, CAS št.: 57-55-6.

**Fungicid v obliki koncentrirane suspenzije (SC) svetlo okrase barve za zatiranje bolezni na vinski trti, vrtninah, jagodah in okrasnih rastlinah.**



**Xi**  
Draži oči. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

**DRAŽILNO**



**N**  
**OKOLJU NEVARNO**

Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik z očmi. Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Snov / pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov. Ne izpuščati / odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila / varnostni list.

**Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.**

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.,**  
Kržičeva 3, Ljubljana  
Tel.: 01/436 12 03  
faks: 01/436 12 14

11

11

12

## SKLADIŠČENJE:

Sredstvo shranjujte v originalni, zaprti embalaži, v hladnem in suhem prostoru, zaščiteno pred vlago, pri temperaturi od +5°C do +25°C, ločeno od hrane, pijače in krmil ter nedostopno otrokom.

## UPORABA:

- **v vinogradih** za zatiranje **oidija vinske trte (*Uncinula necator*), peronospore vinske trte (*Plasmopara viticola*), črne pegavosti vinske trte (*Phomopsis viticola*) in rdečega listnega ožiga vinske trte (*Pseudopeziza tracheiphila*)** v 0,075-0,1% koncentraciji (7,5-10 ml na 10 l vode) ali 0,75-1 l/ha (7,5-10 ml na 100 m<sup>2</sup>) po koncu cvetenja v 10 do 12 dnevni presledkih, odvisno od pogojev za razvoj bolezni. Da bi dosegli dober učinek, priporočamo uporabo pred pojavom bolezni (preventivno).
- **na bučnicah z užitno in neužitno lupino** za zatiranje **pepelovke bučnica (*Erysiphe orontii*, *Sphaeroteca fusca*, *Sphaeroteca fuliginea*)** v 0,075%

2

koncentraciji (7,5 ml/10 l vode) in **kumarne plesni (*Pseudoperonospora cubensis*)** ter za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu **Didymella** v 0,075-0,1% koncentraciji (7,5-10 ml na 10 l vode).

- **na korenju** za zatiranje **korenjevega listnega ožiga (*Alternaria dauci*)** v odmerku 1 l/ha (10 ml/100 m<sup>2</sup>).
- **na spomladanski čebuli** za zatiranje **čebulne plesni (*Peronospora destructor*)** v odmerku 1 l/ha (10 ml/100 m<sup>2</sup>).
- **na čebuli, šalotki in česnu** za zatiranje **čebulne plesni (*Peronospora destructor*)** v odmerku 1 l/ha (10 ml na 100 m<sup>2</sup>).
- **na poru** za zatiranje **papirnate bolezni pora in čebule (*Phytophthora porri*) in porove škrlatne pegavosti (*Alternaria porri*)** v odmerku 1 l/ha (10 ml/100 m<sup>2</sup>).
- **na drobnjaku** za zatiranje **porove škrlatne pegavosti (*Alternaria porri*) in čebulne rje (*Puccinia allii*)** v odmerku 1 l/ha (10 ml/100 m<sup>2</sup>).
- **na paradižniku, jajčevcih in papriki**

3

za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu **Alternaria, Peronospora** in **Phytophthora**, **krompirjeve plesni (*Phytophthora infestans*)** in **paradižnikove pepelovke (*Leveillula taurici*)** v odmerku 1 l/ha (10 ml/100 m<sup>2</sup>).

- **na beluših** za zatiranje **belušev rje (*Puccinia asparagi*) in belušev rjave pegavosti (*Stemphylium spp.*)** v odmerku 1 l/ha (10 ml/100 m<sup>2</sup>). Uporaba je dovoljena v mladih nasadih belušev, kjer se pridelek še ne pobira. V rodni nasadih je uporaba dovoljena samo po pravilu pridelka, to je od sredine junija do sredine septembra.
- **na jagodah** za zatiranje **jagodne pepelovke (*Sphaerotheca macularis*)** v odmerku 0,8-1 l/ha (8-10 ml/100 m<sup>2</sup>).
- **na okrasnih rastlinah** za zatiranje **pepelovk in rj** v 0,1% koncentraciji (10 ml/10 l vode) ali 1 l/ha (10 ml na 100 m<sup>2</sup>).

## OPOZORILA:

Sredstvo lahko na istem zemljišču

4

uporabite največ štirikrat v rastni dobi, pri čemer ga lahko zaporedoma uporabite največ dvakrat. Uporaba nižjega odmerka se priporoča, ko so vremenski pogoji za razvoj bolezni neugodni oziroma so presledki med škropljenji manjši od 7 dni. Ne smete ga uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu (temperatura nad 30°C in hitrost vetra nad 5 m/s).

## UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA:

Pripravek je zelo strupen za vodne organizme, zato morate paziti, da ne onesnažite tekočih in stoječih voda, prav tako pa morate preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov, in sicer tako, da škropite najmanj 20 m od njih.

## FITOTOKSIČNOST:

Če sredstvo uporabljate v predpisanih količinah in na ustrezen način, ne poškoduje gojenih rastlin, preprečiti pa je treba zanašanje sredstva, ker je fitotoksično za nekatere vrste jablan.

5

## MEŠANJE Z DRUGIMI PRIPRAVKI:

Sredstvo lahko mešate s fungicidi za zatiranje sive plesni (*Botryotinia fuckeliana*).

## PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO:

Pred uporabo dobro pretresite še zaprto embalažo. Odmerjeno količino sredstva vlijte skozi sito v rezervoar škropilnice, ki je do polovice napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju rezervoar dopolnite z vodo.

## KARENCA:

21 dni za vinsko trto; 14 dni za korenje, spomladansko čebulo, čebulo, šalotko, česen, drobnjak in por; 3 dni za bučnice z užitno in neužitno lupino, paradižnik, jajčevce, papriko in jagode; za belušje je karenca zagotovljena s časom uporabe.

## ZNAKI ZASTRUPITVE:

Pripravek je relativno malo toksičen fungicid, podatkov o zastrupitvah pri ljudeh ni. Lokalno lahko povzroči

6

draženje oči, v primeru zaužitja pa nespecifično simptomatiko.

## PRVA POMOČ PRI ZASTRUPITVI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umaknite s kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro zračen prostor in jo zavarujte pred mrazom. Zagotovite osnovne življenjske funkcije. Takoj se posvetujte z zdravnikom in mu posredujte podatke o pripravku, ki so na originalni embalaži in / ali v navodilu za uporabo pripravka.

Stik s kožo: Takoj odstranite kontaminirano obleko in obutev, kožo pa temeljito umijte z vodo in milom.

Stik z očmi: Če pride pripravek v oči, s palcem in kazalcem razprite očesni vek in oči temeljito izperite s čisto vodo, v primeru znakov draženja oči se posvetujte z zdravnikom.

Pri zaužitju: V primeru zaužitja ne izzivajte bruhanja, oseba naj popije 2 do 3 dl vode, takoj se posvetujte z zdravnikom.

7