

PPE205169

L120667 SLOV/121

Score[®] 250 EC

Koncentrat za emulzijo (EC) - sistemski fungicid za zatiranje škrlupa na jablanah in hruškah, jablanove pepelovke ter bolezni na vrtninah.

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica

Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži.

Pred uporabo obvezno preberite priloženo navodilo za uporabo in ga shranite.

24 urna dežurna služba,
tel: 00 44 1484 538 444,
Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, VB

® zaščitena znamka firme
Syngenta Group Company



3 831053 977103





1 L

syngenta

Score[®] 250 EC

Score 250 EC vsebuje: 250 g/L difenokonazola; cis,trans-3-kloro-4-[4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil-4-klorofenil eter; CAS št.:119446-68-3.

Koncentrat za emulzijo (EC)-sistemični fungicid za zatiranje škrlupa na jablanah in hruškah, jablanove pepelovke ter bolezni na vrtninah.

<p>Xi</p>  <p>DRAŽILNO</p>	<p>N</p>  <p>OKOLJU NEVARNO</p>	<p>Draži kožo. Nevarnost hudih poškodb oči. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.</p> <p>Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Med uporabo ne piti, ne jesti in ne kaditi. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.</p>
--	---	--

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01/436 12 03, faks: 01/436 12 14

1 L

Izdaja le na podlagi veljavnega potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine.

Skladiščenje: V originalni, zaprti embalaži, v suhem, zračnem prostoru, pri temp. med -5°C in +35°C.

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v navodilu za uporabo.

Odločbo št.: **SFS 9147** z dne 1.12.1999 in spremembo odločbe št. **32702297/01** je dne **9.10.2001** izdalo MKGP, Fitosanitarna uprava RS.

Rok uporabe in številka šarže sta odtisnjena na embalaži.

Proizvajalec: **Syngenta Crop Protection AG**, Basel, Švica

24 urna dežurna služba, tel: 00 44 1484 538 444, Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, VB

© zaščiten znak firme Syngenta Group Company

1 L

Score® 250 EC

Score 250 EC vsebuje: 250 g/L difenokonazola; cis,trans-3-kloro-4-[4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil-4-klorofenil eter; CAS št.:119446-68-3.

Koncentrat za emulzijo (EC)-sistemični fungicid za zatiranje škrlupa na jablanah in hruškah, jablanove pepelovke ter boleznih na vrtninah.



DRAŽILNO



OKOLJU NEVARNO

Xi Draži kožo. Nevarnost hudih poškodb oči. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

N Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Med uporabo ne piti, ne jesti in ne kaditi. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitno za oči/obraz. Vsečina in embalaža morata biti varno odstranjeni. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01/436 12 03, faks: 01/436 12 14

1 L

Izdaja le na podlagi veljavnega potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine.

Skladiščenje: V originalni, zaprti embalaži, v suhem, zračnem prostoru, pri temp. med -5°C in +35°C.

V primeru zastupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v navodilu za uporabo.

Odločbo št.: **SFS 9147** z dne 1.12.1999 in spremembo odločbe št. **32702297/01** je dne **9.10.2001** izdalo MKGP, Fitosanitarna uprava RS.

Rok uporabe in številka šarže sta odtisnjena na embalaži.

Proizvajalec: **Syngenta Crop Protection AG**, Basel, Švica

24 urna dežurna služba, tel: 00 44 1484 538 444, Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, VB

© zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

1 L

Skladiščenje:

V originalni, zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru pri temperaturi med -5°C in +35°C.

Uporaba:

- zatiranje **jablanovega škrlupa (*Venturia inaequalis*)** in **hruševega škrlupa (*Venturia pyrina*)**: za preventivna škropljenja v konc. 0,02% ali 2 ml/10 L vode pri porabi 1000 L vode/ha, (0,2 L/ha ali 2 ml/100 m²). Škropite od stadija C-C3 (stadij mišjih ušes) oz. v času primarnih infekcij do stadija I-J, ko plodovi dosežejo premer 10 mm, v 7-10 dnevni presledkih, kasnejša škropljenja v presledkih 12-18 dni; za kurativna škropljenja v konc. 0,03% ali 3 ml/10 L vode pri porabi 1000 L vode/ha, (0,3 L/ha ali 3 ml na 100 m²). Škropite v roku 96 ur po nastopu pogojev za okužbo, naslednja škropljenja v presledkih 6-9 dni, ko so zopet pogoji za okužbo.
- zatiranje **jablanove pepelovke (*Podospaera leucotricha*)** za lažje in srednje okužbe, lahko uporabite 0,02% konc. ali 2 ml/10 L vode pri porabi 1000 L vode/ha, (0,2 L/ha ali 2 ml/100 m²).
- zatiranje **črne listne pegavosti kapusnic (*Alternaria Brassicae*)**, suhe trohnobe zelja (***Leptosphaeria macularis*** in ***Pseudocercospora capsellae***) na **kapusnicah** v odmerku 0,3-0,5 L/ha (3-5 ml/100 m²), pri porabi 100-500 L vode/ha (1-5 L vode na 100 m²), v razmaku 15 dni. Škropite lahko 3-4 krat v eni rastni dobi. Prvič škropite v fazi 5-7 lista.
- zatiranje **pepelovke kobulnic (*Erysiphe heraclei*)** in **korenjevega listnega ožiga (*Alternaria dauci*)** v odmerku 0,3-0,5 L/ha (3-5 ml/100 m²) pri porabi vode 100-500 L/ha (1-5 L vode/100 m²), v razmaku 12-18 dni. Škropite lahko 2-3 krat v eni rastni dobi, ob pojavu infekcije.
- zatiranje **listen pegavosti zelene (*Septoria apiicola*)** na **gomoljni** in **stebelni zeleni** v odmerku 0,3-0,5 L/ha (3-5 ml/100 m²) pri porabi vode 100-500 L/ha (1-5 L vode/100 m²), v razmaku 14 dni. Škropite lahko 4 krat v eni rastni dobi, po pojavu infekcije.

f) zatiranje **jagodne pepelovke (*Sphaerotheca aphansis*)**, **črne in okrogle listne pegavosti paradižnika (*Alternaria solani* in *Septoria lycopersici*)** ter **paradižnikove pepelovke (*Leveillula taurica*)**, **listne pegavosti**, ki jih povzročajo gljive iz rodov **Alternaria** in **Septoria** na **peteršilju**, **čebulne črnobe (*Cladosporium allii*)** in **rj (*Puccinia spp.*)** na **čebuli**, **poru**, **šalotki**, **česnu**, in **drobnjaku**, **solatne pegavosti (*Microdochium panattonianum*)**. Škropite v konc. 0,05% (0,5 ml/1 L vode) ali 500 ml/ha (5 ml/100 m²) pri porabi 1000 L vode/ha (10 L vode/100 m²), največ 4 krat v eni rastni dobi, ob pojavu infekcije.

V rastlinjaku: za zatiranje **črne gnilobe stebela kumar (*Didymella bryoniae*)** v konc. 0,05% (0,5 ml/1 L vode) ali 500 ml/ha (5 ml/100 m²) pri porabi vode 1000 L/ha (10 L vode/100 m²).

Opozorilo:

S sredstvom smete škropiti največ 4 krat letno na isti površini.

Varovanje okolja:

Pri uporabi morate preprečiti onesnaženje tekočih in stoječih voda, podtalnice oz. vodnih izvirov tako, da tretirate najmanj 20 m od njih.

Fitotoksičnost:

Ob pravilni uporabi sredstvo ne poškoduje škropljenih rastlin.

Kompatibilnost:

Pripravek se lahko meša z večino standardnih sredstev za varstvo rastlin. Priporočljivo je narediti manjši test mešanja.

Priprava škropiva:

Škropilnico napolnite z vodo do 3/4 in nato ob stalnem mešanju dodajte odmerjeno količino Scora, ter škropilnico dopolnite z vodo in zmes premešajte. Škropivo morate mešati tudi med škropljenjem.

Karenca:

za jabolka in hruške 28 dni, za kapusnice, jagode, peteršilj in solate 21 dni, za korenje, zeleno, čebulo, česen, por, šalotko in drobnjak 14 dni, za paradižnik in kumare 3 dni.

Znaki zastrupitve:

Pojav znakov zastrupitve je odvisen od poti pripravka v organizem, od količine in časa izpostavljenosti.

Prva pomoč:

- pri stiku s kožo takoj slecite vso omočeno obleko in kožo sperite z vodo in milom;
- pri stiku z očmi odprte oči spirajte s tekočo vodo 15 minut;
- pri zaužitju ne smete izzvati bruhanja, takoj pokličite zdravnika, ponesrečenca prenesite iz kontaminiranega prostora na svež zrak, nezavestni osebi sprostite dihalne poti in odpnite tesne dele obleke, jo položite na bok in toplo pokrijte.

Specifičen protistrup ni znan, zdravljenje je simptomatično.

Ukrepi pri nezgodi:

Če pride do razlitja sredstva (pri delu, prevozu, skladiščenju), morate preprečiti onesnaženje okolja. Tekočino na tleh počistite z vpojno snovjo (npr. žagovina, suha zemlja, itd.). Ostanke shranite v primerno (tesno zaprto) embalažo, jo označite in predajte v uničenje. Podrobnejša navodila za take primere vam posreduje proizvajalec.

Postopek z ostankom pripravka in s prazno embalažo:

Prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnanje morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za steklenice in plastenke) embalažo lahko odstranite kot nenevaren odpadek skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo brezplačno prepustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.

Odločbo št.: **SFS 9147** z dne 1.12.1999 in spremembo odločbe št.: **32702297/01** je dne 9.10.2001 izdalo MKGP, FURS

Navodilo za uporabo je takšno, kot ga je odobril pristojni organ

Proizvajalec jamči za kakovost pripravka, dokler se prodaja v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži. Za škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe in nepravilnega shranjevanja pripravka, proizvajalec ne odgovarja.

® zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

© 2001 Syngenta Crop Protection AG

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica

Zastopnik:

Syngenta Agro d.o.o., Ljubljana, Kržičeva 3,

tél.: 01/436 12 03

faks: 01/436 12 14