

nuditi prvo pomoč.
Splošni ukrepi: Obolelo osebo je treba umakniti na svež zrak ali v zračen prostor in paziti, da se ne podhladi.
V primeru kontakta pripravka s kožo, je treba sleči obleko in prizadete dele kože dobro umiti z milom in vodo.
Če je pripravek prišel v oči, s palcem in kazalcem razprite očesni vekli in oči temeljito sperite s čisto vodo.
Pri vdihavanju: se ravnajte po splošnih ukrepih.
Pri zaužitju usta sperite z vodo, prizadeti naj popije 2 do 3 dl vode.

Če oseba ni pri zavesti, se ji ne sme dati ničesar piti, niti se ne sme izzivati bruhanja.
Zdravljenje: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca, dajte aktivno oglje (1g/kg telesne teže), razredčeno z vodo v razmerju 1:4. **Specifičnega protistrupa ni, zdravljenje je simptomatično.**
Varnostni ukrepi v primeru nezgode v zaprtem prostoru ali pri prevozu:

V primeru nezgode morate uporabiti vso predpisano zaščitno opremo, zavarovati mesto nesreče in obvestiti pooblaščen osebe.

V zaprtem prostoru: Dajte poškodovano embalažo v posebej označeno, večjo embalažo, raztreseno sredstvo navlažite, da ga veter ne bi raznesel. Pripravek zberite v ustrezne in posebej označene posode, ki jih oddajte pooblaščenemu podjetju za uničevanje nevarnih industrijskih odpadkov. Tla in umazane predmete očistite še z vodo in detergentom. Večje količine vode za izpiranje zberite v posode, da preprečite onesnaženje odtočnih kanalov, stojnic in tekočih voda. **Na odprtem prostoru:** Postopajte kot v zaprtem prostoru. **Pri nezgodi med prevozom:** Zavarujte mesto nesreče, preprečite nastajanje nadaljnje škode in obvestite Center za obveščanje na tel. št.: 112. Sicer ravnajte kot pri raztrosu v zaprtem prostoru. **V primeru požara** Gasite s prahom, peno, CO₂ ali drugimi kemičnimi sredstvi, le izjemoma gasite z vodo. Pri gorjenju se sproščajo strupeni plini, zato morate uporabiti dihalne aparate in zaščitno obleko.

Postopek z ostankom pripravka in s prazno embalažo: Prazno embalažo, ostanke neporabljene sredstva in sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranite kot nevaren odpadke skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo brezplačno prepustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.

Odločbo št.: 327-xxx-xx/00 je dne xx. 4. 2006 izdalo MKGP, Fitosanitarna uprava RS.

Navodilo je takšno, kot ga je odobril pristojni organ.

Obseg jamstva: Proizvajalec jamči za kakovost pripravka, dokler se prodaja v izvorni zaprti embalaži. Za škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega shranjevanja pripravka, proizvajalec ne odgovarja.


© zaščitena znamka firme Syngenta Group Company
© 2001 Syngenta Crop Protection AG

Proizvajalec: **Syngenta Crop Protection AG**, Basel, Švica

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01/436 12 03 faks: 01/436 12 14

Lxxxxxxx xxxx/xx

THIOVIT[®] Jet



Thiovit Jet vsebuje: 80 % žvepla; CAS št.: 7704-34-9

Fungicid za zatiranje pepelovk na breskvah, žitih, hmelju, kumarah, hrastu in okrasnih rastlinah, oidija in pršic na vinski trti in škrupa na breskvah in jablanah v obliki močljivih zrn (WG).

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krnil. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3; tel.: 01/436 12 03, faks: 01/ 436 12 14

1 kg

Izdaja brez potrdila iz fitomedicine.

Skladiščenje: Hranite v originalni, zaprti embalaži, v zračnem in suhem prostoru, zavarovano pred neposrednimi sončnimi žarki in vlago ter ločeno od virov vžiga.

V primeru zastupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v navodilu za uporabo.

Odločbo št.: 327-02-349/2004/8 je dne 6. 4. 2006 izdalo MKGP, Fitosanitarna uprava RS.

Rok uporabe je odtisnjen na embalaži.
Številka šarže je odtisnjena na embalaži.

Prodaja je dovoljena samo v izvorni embalaži.

Proizvajalec: **Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica**

24 urna dežurna služba, tel.: 00 44 1484 538 444,
Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, VB

© zaščiteno ime pripravka Syngenta Group Company



1 kg



syngenta

Navodilo za uporabo:

Način delovanja: fungicid s kontaktnim delovanjem.

Uporaba:

- **na vinski trti** za zatiranje
 - a) **oidija vinske trte (*Uncinula necator*)** v odmerku 3 do 6 kg/ha (30-60 g/100 m²) od časa pojava treh pravih listov naprej (BBCH 13).
 - b) **pršice trsne kodravosti (*Calepitrimerus vitis*) in trsne pršice (*Colomerus vitis*)** v 2% koncentraciji pri porabi 400-800 L vode/ha (4-8 L vode/100 m²), v času napenjanja očes (BBCH 05-07).
 - **na hmelju** za zatiranje **hmeljeve pepelovke (*Sphaerotheca macularis*)** v 0,25 % koncentraciji, odvisno od listne mase.
 - **na jablanah** za zatiranje **jablanovega škrupa (*Venturia inaequalis*)** v odmerku 3-7 kg/ha (30-70 g/100 m²). Zaradi nižje stopnje učinkovitosti se pripravek priporoča predvsem za uporabo v ekološki pridelavi.
 - **na breskvah** za zatiranje **breskove pepelovke (*Sphaerotheca pannosa var. persicae*)** in **breskovega škrupa (*Venturia carpophila*)** v 0,3-0,5 % koncentraciji pri porabi 1000 L vode/ha oziroma 30-50 g/100 m² pri porabi 10 L vode/100 m²). Tretirajte po cvetenju.
 - **na pšenici in ječmenu** za zatiranje **pšenične pepelovke (*Blumeria graminis tritici*)** in **ječmenove pepelovke (*Blumeria graminis hordei*)** v odmerku 6-8 kg/ha (60-80 g/100 m²). Zaradi nižje stopnje učinkovitosti se pripravek priporoča predvsem za uporabo v ekološki pridelavi.
 - **na kumarah** za zatiranje **pepelovke bučnic (*Erysiphe cichoriacearum*)** v odmerku 1,5 kg/ha (15 g/100 m²).
 - **na kosmuljah** za zatiranje **ameriške kosmuljeve pepelovke (*Sphaerotheca mors-uvae*)** v odmerku 4-5 kg/ha (40-50 g/100 m²).
 - **na okrasnih rastlinah** za zatiranje **pepelovk (*Erysiphe* spp.)** v 0,1 do 0,2 % koncentraciji.
 - **na hrastu** za zatiranje **pepelovke na hrastu (*Microspora alphitoides*)** v drevesnicah odmerku 1,2 kg/ha (12 g/100 m²).
- Pripravek uporabljajte preventivno, ob ugodnih pogojih za razvoj bolezni. Razmik med posameznimi tretiranjimi naj bo 7 do 14 dni, odvisno od pogojev za razvoj bolezni.
- Varovanje okolja:** Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevate predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m od vodnih virov prvega in drugega reda.
- Mešanje z drugimi pripravki:** Thiovit Jet ni priporočljivo mešati z drugimi pripravki za varstvo rastlin. Predvsem se ne sme mešati s pripravki na osnovi kaptana, folpeta in ditiokarbamatov ter z oljnimi pripravki.
- Fitotoksičnost** (občutljivost rastlin): Pripravek ne povzroča poškodb na navedenih kulturah, če se uporablja v skladu s priporočili.
- Priprava škropilne brozge:** Rezervoar škropilnice do polovice potrebne količine napolnite s čisto vodo, dodajte odmerjeno količino pripravka in rezervoar dopolnite z vodo. Mešalo mora biti vključeno ves čas med pripravljanjem škropilne brozge in med škropljenjem. Škropite s šobami, ki se navadno uporabljajo za škropljenje s fungicidi.
- Karenca:** 35 dni za pšenico in ječmen, 28 dni za vinsko trto, 21 dni za breskve, 8 dni za hmelj, 7 dni za jabolka in kosmulje, 3 dni za kumare.
- Znaki zastupitve in prva pomoč:** Glede na do zdaj znane podatke o zastupitvah, specifičnih znakov zastupitve z žveplom ni, pojavljajo pa se lahko naslednji znaki:
- akutni: gastrointestinalne in nevrološke motnje, motnje v dihanju.
- kronični: motnje v dihanju, težave s kožo.
Če se pokažejo nespecifični znaki, kot so slabost, glavobol, bruhanje, in sumite na zastupitev, je treba poklicati zdravnika, do njegovega prihoda pa ponesrečenemu