

2. UPORABA: Sredstvo BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX VERDE deluje kot dotikalni in želodčni insekticid s širokim spektrom delovanja. Uporablja se za zatiranje **listnih uši (Aphididae), resokrilcev (*Thrips spp.*) in rastlinjakovega ščitkarja (*Trialeurodes vaporariorum*) na okrasnih rastlinah ter vrtninah (kumare, paradižniku, fižol, grah in listna zelenjava) v rastlinjakih in na prostem. Rastline, ki so jih napadli škodljivci, se poškopijo po vsej površini.**

OPOZORILA: Sredstvo hitro razpade pod vplivom svetlobe, zato moramo tretiranje ob dolgotrajnejših napadih listnih uši večkrat ponoviti. Tretiranje je zato najbolje izvesti pod noč.

FITOTOKSIČNOST: Potrebno je zmerno tretiranje. Ob pretiranem omočenju rastlin lahko postane fitotoksičen za cvetove nekaterih okrasnih rastlin. Ne sme se tretirati neposredno po nežnejših cvetovih npr. surfinij ali vodenk.

KARENCA: Karenca za kumare, paradižnik, fižol in grah je 4 dni ter za listno zelenjavo 7 dni.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov za piretrine za zelenjavo so v skladu s predpisi o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE:

Sredstvo BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX VERDE se razvršča kot:

S2	Hraniti zunaj dosega otrok.
S13	Hraniti ločeno od hrane pijače in krmil.
S20/21	Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

Proizvajalec je dolžan, da nevarnost sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo.

Pri uporabi pripravka moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov s tem, da tretiramo najmanj 20 m od njih.

MEDICINSKI UKREPI:

Pri zaužitju: Ne izzivati bruhanja. Poklicati zdravnika.

Pri stiku s kožo: Kožo spirati z veliko vode. Odstraniti kontaminirano obleko.

Pri stiku z očmi: Oči izpirati z vodo.

Pri vdihavanju: Osebo umakniti na svež zrak. Poklicati zdravnika.

Navodilo zdravniku: Zdravljenje je simptomatsko.