

4. UPORABA:

CLARINET se uporablja za zatiranje:

- **jablanovega škrlupa** (*Venturia inaequalis*), **hruševega škrlupa** (*Venturia pyrina*) in **jablanove pepelovke** (*Podosphaera leucotricha*) na jablanah in hruškah v 0,1 % koncentraciji oziroma odmerku 1-1,5 L/ha ob porabi vode 1000 do 1500 l/ha.

S tretiranjem se začne, ko so sadna drevesa v fazi od mišjega ušesa do zelenih brstov (fenološka faza C3/D), konča pa glede na predpisano karenco. Presledki med tretiranjmi naj bodo 10 do 14 dni ob normalnih pogojih, sicer pa se upoštevajo navodila opazovalno napovedovalne službe. Clarinet učinkuje kurativno 72 do 96 ur po okužbi.

Da se prepreči razvoj odpornih sevov parazitskih gliv, se tretira v najbolj občutljivi fazi razvoja sadnih rastlin za okužbe s parazitskimi glivami, to je od začetka cvetenja (fenološka faza F) pa do takrat, ko so plodiči velikosti orehov (fenološka faza J).

OPOZORILA: CLARINET se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni uporabi največ trikrat.

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in izvirov s tem, da se tretira najmanj 20 m od njih.

FITOTOKSIČNOST: CLARINET ni fitotoksičen, če se uporablja v skladu z navodili.

MEŠANJE: Sredstva se ne sme mešati s pripravki, ki vsebujejo aluminij.

6. **KARENCA:** 56 dni za jablane in hruške.