

2. UPORABA

Sredstvo CONFIDOR 70 WG se uporablja kot sistemski insekticid z dolgotrajnim kontaktnim in oralnim (želodčnim) delovanjem:

a) na **hmelju za mazanje hmeljnih trt** za zatiranje **hmeljeve listne uši (*Phorodon humuli*)** v odmerku 0,17 kg/ha ob porabi 6 L vode na ha.

Eno tretiranje zadostuje za uspešno zatiranje listnih uši pod pogojem, da odmerek insekticida ni prenizek oziroma postopek mazanja ni izveden prepozno.

Priprava raztopine za mazanje: Posodo za brozgo za tretiranje se napolni s 3/4 zahtevane količine vode, doda se sredstvo v ustreznem odmerku in posodo napolni s preostankom vode. Temeljito je treba premešati! Ne pripravi se več brozge za tretiranje, kot se jo potrebuje.

Cas uporabe: Sredstvo se uporablja v razvojni fazi, ko trte dosežejo 50% višine žičnice, do razvojne faze ko je rast glavnih poganjkov zaključena (BBCH 35-39), to je od začetka do sredine meseca junija, odvisno od sorte hmelja. Insekticid, ki se ga namaže na hmeljne trte, svojo največjo učinkovitost na področju vršičkov hmelja doseže 2–3 tedne po mazanju.

Navodila za uporabo v hmelju:

- Pred tretiranjem je treba na trtah na višini 1,0–1,2 m v dolžini 40–60 cm odstraniti liste.
- Na tem območju je treba vsako trto premazati v dolžini 30 cm.
- Da ne pride do prekomernega kapljanja raztopine za mazanje in da se doseže enakomeren nanos raztopine za mazanje na vse trte, je treba čopič pred mazanjem vsake naslednje trte ponovno potopiti v raztopino za mazanje in ga nalahno odcediti.
- Vse trte, ki se vzpenjajo po posameznem vodilu, je treba enakomerno premazati.
- Raztopino za mazanje se večkrat temeljito premeša, da se prepreči usedanje sredstva.

Opozorilo: Na istem zemljišču se lahko sredstvo uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni.

b) **na kumarah, jajčevcih, kumaricah za vlaganje, bučkah, paprikah in paradižniku, gojenih v zaščiteneh prostorih (rastlinjakih,...)**, pri naslednji gostoti rastlin:

| | |
|---------------------------|--|
| paradižnik | največ 25.000 rastlin/ha oz. 2,5–3 stebela na 1 m ² |
| paprika | največ 32.000 rastlin/ha oz. 6,5 stebel na 1 m ² |
| kumare, jajčevci in bučke | največ 15.000 rastlin/ha |

- za zatiranje **listnih uši (*Aphididae*)** v odmerku 3,5 g/1000 rastlin - sredstvo se doda vodi za kapljično namakanje;
- za zatiranje **tobakovega ščitkarja (*Bemisia tabaci*)** in **rastlinjakovega ščitkarja (*Trialeurodes vaporariorum*)** v odmerku 14 g/1000 rastlin - sredstvo se doda vodi za kapljično namakanje.

Čas uporabe: Sredstvo se uporabi od razvojne fazi, ko so klični listi v celoti razviti do razvojne faze, ko 90% plodov kaže značilno zrelostno bravo (BBCH 10-89).

Opozorilo: Na istem zemljišču (v zaščitenem prostoru) se lahko sredstvo uporabi največ dva krat, v časovnem razmaku 7 dni.

Sredstvo je prepovedno uporabljati na kumarah, jajčevcih, kumaricah za vlaganje, bučkah, paprikah in paradižniku, gojenih na prostem. (To opozorilo se na etiketi navede v krepkem tisku.)

c) **na sejančkih kumar, jajčevca, kumaric za vlaganje, bučk, paprik in paradižnika, gojenih v zaščiteneh prostorih (rastlinjakih,...)**, za zatiranje **listnih uši**

(**Aphididae**) v odmerku 0,15 kg/ha pri porabi vode 500 L/ha.

Čas uporabe: Sredstvo se uporabi v razvojni fazi od setve do popolne razvitosti kličnih listov (BBCH 00-10).

Opozorilo: Na istem zemljišču (v zaščitenem prostoru) se lahko sredstvo uporabi največ enkrat v eni rastni dobi.

Sredstvo je prepovedno uporabljati na sejančkih kumar, jajčevca, kumaric za vlaganje, bučk, paprik in paradižnika, ki se bodo sadili na prostem. (To opozorilo se na etiketi navede v krepkem tisku.)

- d) **na okrasnih rastlinah, gojenih v zaščitenih prostorih (rastlinjakih,...)**, za zatiranje **tobakovega ščitkarja (*Bemisia tabaci*)** in **rastlinjakovega ščitkarja (*Trialeurodes vaporariorum*)** v 0,035 % koncentraciji in porabi vode 1000 L/ha (35 g na 100 L vode).

Čas uporabe: Sredstvo se uporablja v razvojni fazi popolne razvitosti kličnih listov do začetka cvetenja (BBCH10-60). Sredstvo se lahko uporabi samo pred začetkom cvetenja tretiranih rastlin!

Opozorilo: Na istem zemljišču (v zaščitenem prostoru) se lahko sredstvo uporabi največ dva krat, v časovnem razmaku 10 do 14 dni.

Sredstvo je prepovedno uporabljati na okrasnih rastlinah, gojenih na prostem. (To opozorilo se na etiketi navede v krepkem tisku.)

Občutljivost okrasnih rastlin:

V skladu z dosedanjimi izkušnjami okrasne rastline, naštete v nadaljevanju, niso prizadete, če se upoštevajo priporočeni odmerki sredstva in se ne tretira po cvetovih:

Adiantum tenerum, hibridi vrste *Anthurium andreanum*, hibridi vrste *Anthurium scherzerianum*, *Asplenium nidus*, *Calceolaria integrifolia*, *Chrysanthemum indicum* – hibrid »Minstrel«, *Chrysanthemum indicum* – hibrid »Nikita«, *Chrysanthemum indicum* – hibrid »Yellow Star«, *Chrysanthemum frutescens*, *Dianthus cariophyllus*, *Euphorbia pulcherrima*, *Ficus benjamina*, *Fuchsia* – hibrid »Koralle«, *Fuchsia* – hibrid »Bacon«, *Fuchsia* – hibrid »Swingtime«, *Fuchsia* – hibrid »Miss Gray«, *Fuchsia* hibrid »Winston Churchill«, *Hedera helix*, *Nephrolepis exaltata*, *Rhododendron simsii*, *Saintpaulia ionantha*.

Zaradi spreminjajočih se pogojev pri vzgoji rastlin in številnih različnih vrst in sort okrasnih rastlin ni mogoče podati splošno veljavne izjave o občutljivosti okrasnih rastlin na FFS CONFIDOR 70 WG. Zato se priporoča, da se vpliv sredstva najprej preizkusi na nekaterih izbranih rastlinah ali pa se je treba posvetovati z imetnikom registracije.

OPOZORILO PRI UPORABI V ZAŠČITENIH PROSTORIH: Uporaba sredstva je lahko škodljiva za oprasovalce (npr. čmrlje) v zaščitenih prostorih. Glede potrebne čakalne dobe med tretiranjem in vnosom oprasovalcev se posvetujte z zastopnikom.

FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v predpisanem odmerku in na ustrezen način, za naštete gojene rastline ni fitotoksično.

KARENCA: Karenca je za hmelj zagotovljena z načinom uporabe; 3 dni je za kumare, jajčevce, kumarice za vlaganje, bučke, paprike in paradižnik; za okrasne rastline karenca ni potrebna.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov *imidakloprid* so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo CONFIDOR 70 WG se razvršča in označi kot:

Piktogrami GHS:



GHS07



GHS09

Opozorilne besede:

Pozor

Stavki o nevarnosti:

H302

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H410

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kategorija:

Akut. strup. 4, H302

Akut. in kron. za vod. okolje

1, H410

Dodatne informacije o nevarnosti:

EUH401

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Previdnostni stavki - preprečevanje:

P264 Po uporabi temeljito umiti roke.

P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Previdnostni stavki - odziv:

P301+P312

PRI ZAUŽITJU ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P330

Izprati usta.

P391

Prestreči razlito tekočino.

Previdnostni stavki - shranjevanje: /

Previdnostni stavki - odstranjevanje:

P501

Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Dodatni stavki:

SP 1

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Spe8

Nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk oprasovalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti plevel pred cvetenjem.

Dodatni simboli:



Nevarno za čebele

Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja, škropljenju oziroma rokovanju s sredstvom (zalivanju, mazanju hmeljnih trt) mora delavec uporabljati zaščitne rokavice in zaščitno obleko (delovni kombinezon). Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače) in zaščitne rokavice.

DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca je treba zagotoviti varnost reševalca. Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino in se ji zagotovimo osnovne življenjske funkcije. V primeru nezavesti se ga namesti v položaj za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje po standardnem ABC postopku: sprostitve dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.

Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. Če se pojavijo znaki draženja se pokliče zdravnika. Pred ponovno uporabo je treba obleko oprati.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in oči temeljito spera s čisto vodo. V primeru draženja oči se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: Ponesrečencu se takoj spere usta z vodo in se mu da piti do 2 dl vode. Ne izziva se bruhanja. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzivati bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

Navodilo za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se želodca, razen, če tako svetuje Center za zastrupitve. Aktivno oglje in salinično odvajalo se uporabi le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.