

2. UPORABA

Sredstvo CYMBAL se uporablja kot preventivni, lokalno sistemični (translaminarni) fungicid:

- **v krompirju** za zatiranje v razmerah nizkega pritiska in za zmanjševanje okužb v razmerah srednje visokega pritiska bolezni **krompirjeve plesni (*Phytophthora infestans*)** v odmerku 0,2-0,25 kg/ha (2-2,5 g/100 m²), največ 4 krat v eni rastni sezoni, od razvojne faze, ko se začnejo vrste sklepati (BBCH 31), oz. najdlje do razvojne faze, ko je 50 % listov rjavkastih (BBCH 95). Tretira se v razmiku 7-10 dni v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe. Priporočena poraba vode je 200-600 L/ha (2-6 L/100 m²).
 - **na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja** za zatiranje v razmerah nizkega pritiska in za zmanjševanje okužb v razmerah srednjega pritiska bolezni **peronospore vinske trte (*Plasmopara viticola*)**
 - do začetka cvetenja (do BBCH 61) največ 0,125 kg/ha (1,25 g/100 m²), ob porabi vode 200-600 L/ha;
 - po začetku cvetenja (od BBCH 61 naprej) največ 0,25 kg/ha (2,5 g/100 m²), ob porabi vode 200-1000 L/ha.
- Trto se lahko na istem zemljишču tretira največ 7 krat v eni rastni sezoni, v razmiku 7-10 dni, glede na vremenske razmere in intenzivnost okužbe.

OPOZORILO: Za izboljšanje delovanja sredstva se priporoča, da se uporabi sredstvo CYMBAL v kombinaciji z drugim preventivnim fungicidom.

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo vsebuje aktivno snov *cimoksanil*. Tveganje za razvoj rezistence na aktivno snov *cimoksanil* je srednje. Tveganje za razvoj rezistence na krompirjevo plesen je prav tako srednje, na peronosporo vinske trte je tveganje visoko. Pri večletni uporabi fungicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah lahko na takšnih površinah naravno prisotni manj občutljivi sevi postanejo odporni, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. V izogib temu se priporoča, da se v škropilnih programih uporabijo fungicidi z različnim načinom delovanja. Za preprečevanje pojava odpornosti se priporoča, da se v škropilnem programu uporablja največ polovica sredstev, ki vsebujejo aktivno snov *cimoksanil*.

KOLOBAR: Nobenih omejitev ni za rastline, ki sledijo v kolobarju.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se uporablja v skladu z navodili za uporabo.

KARENCA: Za krompir in trto 7 dni.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov *cimoksanil* so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo CYMBAL se **razvršča in označi** kot:

Piktogrami GHS:



GHS07



GHS08



GHS09

Opozorilne besede:	Pozor
Stavki o nevarnosti:	
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H361fd	Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H373	Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H410	Zelostrupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kategorija:

Draž. oči 2, H319
 Preobč. kože 1, H317
 Razmn. 2, H361fd
 STOT RE 2, H373
 Akut. in kron. za vod. okolje
 1, H410

Dodatne informacije o

nevarnosti:

EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnjajte v skladu z navodili za uporabo.

Previdnostni stavki - preprečevanje:

P260 Ne vdihavati prahu/meglice.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

Previdnostni stavki - odziv:

P333+P313	Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P337+P313	Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P308+P313	Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P391	Prestreči razlito tekočino.

Previdnostni stavki - shranjevanje: /

Previdnostni stavki - odstranjevanje:

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Dodatni stavki:

SP 1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločtvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o spremembah obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja, med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico/pršilnikom in med tretiranjem z ročno oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in zaščito za dihala ter oči/obraz.

Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in rokavice.

DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Spološni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom ozziroma vročino. Zagotoviti je treba osnovne življenske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.

Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s čisto vodo. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne izizza se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodilo za uporabo sredstva.

Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenske funkcije. Specifičen protistrup ni poznani. Zdravljenje je simptomatično in podporno.