

4. UPORABA:

DEVIRINOL 45 FL se uporablja za zatiranje nekaterih vrst **enoletnega (ozkolistnega in širokolistnega) plevela**:

a) v poljščinah:

- v paradižniku in papriki (ne za zgodnje sorte) iz sadik v odmerku 2,5 - 4 L/ha (25 - 40 ml na 100 m²), tretira se pred presajanjem z inkorporacijo na globino 2 - 5 cm;

- v zelju, brstičnem ohrovtu in cvetači iz sadik v odmerku 2 - 2,5 L/ha (20 - 25 ml na 100 m²), tretira se pred sajenjem z inkorporacijo na globino 2 - 5 cm;

- v ozimni oljni ogrščici v odmerku 2,5 L/ha (25 ml na 100 m²), tretira se pred setvijo z inkorporacijo na globino 2 - 5 cm;

- v bučah za pridelovanje olja v odmerku 2 - 2,5 L/ha (20 - 25 ml na 100 m²), tretira se pred setvijo z obvezno plitvo inkorporacijo;

b) v jagodah v odmerku 3 - 6 L/ha (30 - 60 ml na 100 m²), tretira se med mirovanjem rasti, pred vznikom plevela.

Tretira se ob porabi vode 300 - 600 L na ha (3 - 6 L na 100 m²).

OPOZORILA: DEVIRINOL 45 FL ne deluje na plevle iz družin križnic (Brassicaceae) in razhudnikov (Solanaceae). Ne sme se ga uporabljati v paradižniku z drobnimi plodovi in v zgodnjih sortah paprike.

Sredstva se ne sme uporabljati na peščenih zemljiščih, na zemljiščih, ki vsebujejo več kot 10 % humusa in na izrazito suhih ali vlažnih tleh. Na tretiranih površinah se ne sme najmanj 12 mesecev sejati strnih žit (ovsa 16 mesecev), koruze, sirka, solate, sladkorne in krmne pese. Drugo leto se lahko spomladi seje kapusnice, oljno ogrščico, krompir, papriko, paradižnik, grah, fižol, tobak in sončnice.

DEVIRINOL 45 FL se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni.

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov s tem, da se tretira najmanj 20 m od njih.

6. KARENCA: 72 dni za papriko, paradižnik, zelje, brstični ohrovt in cvetačo, 58 dni za jagode, za oljno ogrščico in buče je zagotovljena s časom uporabe.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov *napropamid* so za oljno ogrščico, zelje, cvetačo, brstični ohrovt, paradižnik, papriko 0,1 mg/kg, za jagode 0,2 mg/kg ter za seme bučnic 0,05* mg/kg.«.