

2. UPORABA:

DOMINATOR ULTRA 360 SL se uporablja kot sistemski neselektivni herbicid za zatiranje **enoletnega in večletnega širokolistnega ter ozkolistnega plevela:**

1. v **strniščih, sadovnjakih, vinogradih** in na **nekmetijskih površinah** za zatiranje:

a) **enoletnega plevela** v odmerku 2-4 L/ha (20-40 ml na 100 m²);

b) **večletnega plevela** in sicer odvisno od vrste v odmerku:

- 8-10 L/ha (80-100 ml na 100 m²) za zatiranje **prstastega pesjaka** (*Cynodon dactylon*), ko plevel doseže višino 15-20 cm, oziroma dvakrat 3-4 L/ha pri deljeni (split) aplikaciji;
- 6-8 L/ha (60-80 ml na 100 m²) za zatiranje **njivskega slaka** (*Convolvulus arvensis*) v času cvetenja;
- 6-7 L/ha (60-70 ml na 100 m²) za zatiranje **robid** (*Rubus spp.*) v septembru in oktobru;
- 5 L/ha (50 ml na 100 m²) za zatiranje **ostric** (*Cyperus spp.*) v času cvetenja;
- 3,5-5 L/ha (35-50 ml na 100 m²) za zatiranje **divjega sirka** (*Sorghum halepense*) v fazi metličenja, **njivskega osata** (*Cirsium arvense*), **kodrolistne kislice** (*Rumex crispus*), **topolistne kislice** (*Rumex obtusifolius*) in **navadnega pelina** (*Artemisia vulgaris*), ko plevel doseže 40 cm, ter **navadnega regrata** (*Taraxacum officinalis*);
- 2,5-3,5 L/ha (25-35 ml na 100 m²) za zatiranje **plazeče pirnice** (*Elytrigia repens*), ko doseže višino 25-30 cm.

Navedene odmerke se uporablja ob porabi vode 100-300 L na ha (1-3 L vode na 100 m²). Večje količine vode se uporablja v neugodnih razmerah za razvoj plevela in pri tretiranju večjih plevelnih rastlin.

2. **pri obnovi travnikov in pašnikov:** za tretiranje posameznih plevelnih gnezd (npr. ščavje, kopriva, čmerika) ali celih površin. Tretira se med intenzivno rastjo plevela in travne ruše v odmerkih:

a) 2,5-4 L/ha (25-40 ml na 100 m²) za **enoletni plevel**;

b) 5-7 L/ha (50-70 ml na 100 m²) za **večletni plevel** ob opozorilu, da se lahko na tretiranem zemljišču ponovno pase in kosi najmanj 7 dni po tretiranju. Travno deteljne mešanice se lahko ponovno poseje 14 dni po tretiranju.

3. v **gozdnih nasadih:**

a) v **gozdnih drevesnicah smreke in rdečega bora** za zatiranje **ozkolistnega in širokolistnega plevela:**

- v času mirovanja sadik v 1% koncentraciji ob porabi vode največ 400 L/ha (40 ml na 4 L vode na 100 m²) tako, da se tretira celo površino;
- med aktivno rastjo sadik v 1,5 % koncentraciji ob porabi vode največ 400 L/ha (40 ml na 4 L vode na 100 m²) s tem, da se tretira med vrstami in obvezno uporablja ščitnike;

b) v **mladih nasadih iglavcev** (od sajenja do pet let) za zatiranje **olesenih plevelnih listavcev** v 2 % koncentraciji oziroma 6-8 L/ha ob porabi vode 300-400 L/ha (100 ml na 5 L vode na 100 m²) tako, da se tretira med vrstami in obvezno uporablja ščitnike;

c) za zatiranje **koreninskih izrastkov in poganjkov iz panjev listavcev (hrast, gaber in bukev)** v 15 % koncentraciji (1,5 L na 10 L vode) s premazovanjem takoj po sečnji dreves, od maja do decembra.

d) **za pripravo zemljišč po goloseku gozdov:**

- tretira se koreninske izrastke in drugo vegetacijo v času intenzivne rasti v 1,5 – 2 % koncentraciji (150-200 ml na 10 L vode) pri porabi škropilne brozge 300-400 L/ha;
- tretira se panje dreves takoj po sečnji dreves do oktobra v 2 % koncentraciji (200 ml na 10 L vode) pri porabi škropilne brozge 300-400 L/ha.

OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču na nekmetijskih zemljiščih uporablja največ dvakrat v eni rastni sezoni, v sadovnjakih, vinogradih in na strniščih do trikrat v eni rastni sezoni, na vseh ostalih zemljiščih pa največ enkrat v eni rastni sezoni.

Zaradi popolnega uničenja globokih korenin in rizomov se zemljišča, ki se ga namerava tretirati, ne sme obdelovati najmanj 60 dni pred in 28 dni po tretiranju. Na tretiranih površinah se ne sme pasti živine. Posušenih rastlin s tretiranih površin se ne sme uporabljati za krmljenje živali zaradi možne kontaminacije mleka.

Sredstvo se ne sme uporabljati sadovnjakih mlajših od dveh let in vinogradih mlajših od štirih let.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo lahko deluje fitotoksično, če pade na zelene dele gojenih rastlin.

KARENCA: Karenca za sadovnjake in vinograde je 35 dni.

MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša s sredstvi za izboljšanje močljivosti.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za aktivno snov *glifosat* je v skladu s predpisi o ostankih v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo DOMINATOR ULTRA 360 SL se razvrsti in označi kot:

S2 Hraniti izven dosega otrok.

S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

SP1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

SPe 3 Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati netretiran varnostni pas v skladu s predpisi o varovanju površinskih voda.

Proizvajalec je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o spremembi obvestiti pristojni organ.

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro prezračen prostor in se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Bruhanja se ne izziva. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

Pri zaužitju: Usta se takoj spere z vodo. Prizadeti naj popije 2 do 3 dl vode. Ne izziva se bruhanja. Takoj je potrebno poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

Pri stiku s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo se dobro umije z vodo in milom.

Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in oko spere s čisto vodo. V primeru draženja oči se je potrebno posvetovati z zdravnikom.

Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih.

Nezavestnemu se ne daje ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja.

Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno življenjske funkcije. Ponesrečenemu se po potrebi daje aktivno oglje in odvajalo. V primeru zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca. Zdravljenje je simptomatsko.