2. UPORABA:

Sredstvo ESTERON se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje **enoletnega širokolistnega plevela**:

- **v ozimni in jari pšenici, ječmenu ter tritikali** v odmerku 0,75 do 1 L/ha v fenološki fazi od konca razraščanja (zaznavna dva stranska poganjka) do drugega vidnega kolenca (BBCH 22-32);
- **v koruzi** v odmerku 1 L/ha v fenološki fazi od 4 do 6 listov koruze (BBCH 14-16);
- na **pašnikih** in **travnikih** spomladi v fenološki fazi od razraščanja do stopnje zastavičarja (BBCH 21-39) v odmerku 1 L/ha.

Sredstvo ESTERON zatira nekatere vrste enoletnega širokolistnega plevela, kot so: srhkodlakavi ščir (*Amaranthus retroflexus*), navadni plešec (*Capsella bursa-pastoris*), bela metlika (*Chenopodium album*), njivski osat (*Cirsium arvense*), navadni osat (*Cirsium vulgare*), njiski slak (*Convolvulus arvensis*), navadna rosnica (*Fumaria officinalis*), poljski mak (*Papaver rhoeas*), veliki trpotec (*Plantago major*), ptičja dresen (*Polygonum aviculare*), navadni slakovec (*Polygonum convolvulus*), ščavjelistna dresen (*Polygonum lapathifolium*), breskova dresen (*Polygonum persicaria*), njivska redkev (*Raphanus raphanistrum*), njivska gorjušica (*Sinapis arvensis*), pasje zelišče (*Solanum nigrum*) in perzijski jetičnik (*Veronica persica*).

OPOZORILA: S sredstvom se na istem zemljišču lahko tretira največ en krat v eni rastni dobi. Priporočena poraba vode ob tretiranju je 200-400 L na ha. Zoper vrste iz rodu Polygonum pripravek deluje zgolj zaviralno.

FITOTOKSIČNOST: Ob predpisani uporabi na gojenih rastlinah, za katere je registrirano, sredstvo ne povzroča fitotoksičnosti.
MEŠANJE: Ne priporoča se mešanje tega sredstva z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.
KARENCA: Karenca za pšenico, ječmen in tritikalo ter koruzo je zagotovljena s časom uporabe. Karenca za travnike in pašnike je 28 dni.
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za aktivno snov *2,4-D* je za pšenico, ječmen, tritikalo, koruzo in krmne rastline (travo) v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo ESTERON se **razvršča in označi** kot:

Xn	Zdravju škodljivo.
N	Okolju nevarno.
R38	Draži kožo.
R43	Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R50/53	Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R65	Zdravju škodljivo; pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
S2	Hraniti izven dosega otrok.
S13	Hraniti ločeno od hrane pijače in krmil.
S24/25	Izogibati se stiku s kožo in očmi.
S37	Uporabljati primerne zaščitne rokavice.
S46	Pri zaužitju, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali nalepko.
S60	Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.
S61	Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec oziroma zastopnik

mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS.

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom in vročino, ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj je potrebno poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.
V primeru stika s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in milom. Po potrebi se je posvetujte z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je potrebno oprati delovno obleko.
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oko temeljito izpira s čisto vodo 15 min. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.
V primeru zaužitja: Usta se spere z vodo. Ne izzivamo bruhanja. Nezavestnemu ne dajemo piti ničesar. Takoj je potrebno poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih.
Navodilo zdravniku: Vzpostaviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenske funkcije. Pri zaužitju večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca in dajanje aktivnega oglja. Zdravljenje je simptomatsko.