

2. UPORABA:

EXTRAVON je pomožno sredstvo, ki se dodaja herbicidom. Deluje na način zmanjšanja površinske napetosti škropilne mešanice, kar posledično povzroči omočljivost in pokritost listov tretiranih rastlin. Uporablja se v odmerku 300 ml/ha ob porabi 300 L vode (3 ml na 100 m³ v 3 L vode).

OPOZORILA: EXTRAVON se sme na istem zemljišču uporabiti največ dvakrat v eni rastni sezoni. Sredstvo EXTRAVON se dodaja herbicidom - pri tem je potrebno upoštevati navodilo za uporabo fitofarmacevtskega sredstva, ki se mu le-ta dodaja.

FITOTOKSIČNOST: Ni dovoljeno dodajanje fitofarmacevtskim sredstvom, ki povzročajo fitotoksičnost.

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo EXTRAVON se razvrsti in označi kot:

Xi	Dražilno.
N	Okolju nevarno.
R41	Nevarnost hudih poškodb oči.
R51/53	Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.
S2	Hraniti izven dosega otrok.
S13	Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
S26	Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S36/37/39	Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
S61	Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Proizvajalec je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o spremembi obvestiti pristojni organ.

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja v dobro prezračen prostor ali na svež zrak in se jo zavaruje pred mrazom. Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu posreduje podatke o pripravku, ki so na originalni embalaži in navodilu za njegovo uporabo.

Pri zaužitju: Ponesrečenemu se usta izpere z vodo, popije naj 2 do 3 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar. Če je možno se zdravniku predloži navodila za uporabo.

Pri stiku s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno obleko oprati.

Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vek in oko 15 min temeljito izpira s čisto vodo. Če draženje ne preneha, se je potrebno posvetovati z zdravnikom.

Pri vdihavanju: Ravnamo se po splošnih ukrepih.

Zdravstvena oskrba: Zagotoviti in vzdrževati osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju pripravka se daje aktivno oglje 1 g/kg telesne teže, razredčenega z vodo v razmerju 1:4. V primeru zaužitja večje količine pripravka je v prvih urah indicirano izpiranje želodca. Zdravljenje je simptomatsko. Specifičnega antidota ni.