

» 4. UPORABA: Sredstvo FALCON EC 460 se uporablja:

- a) na pšenici za zatiranje pšenične pepelovke (*Blumeria graminis*), rj (*Puccinia spp.*), pšenične listne pegavosti (*Mycosphaerella graminicola*), rjavenja pšeničnih plev (*Stagonospora nodorum*) in za zmanjševanje okužbe s fuzariozami na klasu (*Fusarium spp.*) v odmerku 0,6 l/ha pri uporabi vode 200 – 400L/ha (6 ml na 2 - 4 L vode na 100 m²);
- b) na ječmenu za zatiranje ječmenove pepelovke (*Blumeria graminis*), rj (*Puccinia spp.*), ječmenovega listnega ožiga (*Rhynchosporium secalis*), ječmenove mrežaste pegavosti (*Pyrenophora teres*) v odmerku 0,6 L/ha pri uporabi vode 200 - 400 L/ha (6 ml na 2 - 4 L vode na 100 m²);

Pšenico in ječmen se tretira v začetku okužbe in najkasneje v razvojnem stadiju EC 61 (začetek cvetenja).

- c) na vinski trti za zatiranje oidija (*Uncinula necator*) v odmerku 0,3 - 0,4 L/ha (3 - 4 ml na 100 m²). Tretira se v začetku napada.

OPOZORILA: Pri tretiranju se mora preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in vodnih izvirov s tem, da se tretira najmanj 20 m od njih.

MEŠANJE: FALCON EC 460 se lahko meša z drugimi sredstvi nevtralne reakcije. Vse mešanice se mora takoj porabiti.

6. KARENCA: 35 dni za pšenico, ječmen in vinsko trto.