

HUSSAR OD je sistemski herbicid za zatiranje **enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevla ter nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevla v ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, rži in tritikali** v odmerku 0,1 L/ha (10 g na 1000m²). Priporočena količina vode je 200 –300 L/ha (20-30 L vode na 1000 m²). Tretira se od začetka razraščanja do začetka razvoja zgornjega lista v ozimni pšenici in ozimnem ječmenu (BBCH 13 do 37), ter od tretjega lista do konca razraščanja v jari pšenici in jarem ječmenu (BBCH 13 do 29). Najboljše rezultate se doseže v času, ko je ozkolistni plevel v fazi dveh listov in do konca razraščanja, in ko je širokolistni plevel v fazi 2 do 6 listov.

HUSSAR OD se uporablja za zatiranje naslednjih vrst **ozkolistnega plevla**: orjaška šopolja (*Agrostis gigantea*), navadni srakoperec (*Apera spica venti*), ljuljka (*Lolium* spp.), čužka (*Phalaris* spp.), enoletna latovka (*Poa annua*), navadna latovka (*Poa trivialis*) in drugih.

HUSSAR OD se uporablja za zatiranje naslednjih vrst **širokolistnega plevla**: zajčji mak (*Adonis* spp.), srhkodlakavi ščir (*Amaranthus retroflexus*), njivska kurja češnjica (*Anagallis arvensis*), prava kamilica (*Anthemis* spp.), loboda (*Atriplex* spp.), žarkasta dvoglavka (*Bifora radians*), navadni plešec (*Capsella bursa pastoris*), modri glavinec (*Centaurea cyanus*), bela metlika (*Chenopodium album*), krizantema (*Chrysanthemum* spp.), njivski osat (*Cirsium arvense*), zebrat (*Galeopsis* spp.), rogovilček (*Galinsoga ciliata*), plezajoča lakota (*Galium aparine*), samonikla sončnica (*Helianthus annuus*), mrtva kopriva (*Lamium* spp.), slezenovec (*Malva* spp.), kamilica (*Matricaria* spp.), meteljka (*Medicago* spp.), njivska spominčica (*Myosotis arvensis*), poljski mak (*Papaver rhoeas*), dresen (*Polygonum* spp.), njivska zlatica (*Ranunculus arvensis*), njivska redkev (*Raphanus raphanistrum*), kislica (*Rumex* spp.), navadni grint (*Senecio vulgaris*), njivska gorjušica (*Sinapis arvensis*), škrbinka (*Sonchus* spp.), njivski oklast (*Spergula arvensis*), navadna zvezdica (*Stellaria media*), detelja (*Trifolium* spp.), grašica (*Vicia* spp.), vijolica (*Viola* spp.) in drugih.

OPOZORILA: HUSSAR OD se lahko na isti površini uporabi največ enkrat v eni rastni dobi. Omejitev v normalnem kolobarju ni. V primeru predčasnega uničenja posevka, se lahko 15 dni po tretiranju poseje jaro pšenico ali jari ječmen. Koruzo se lahko poseje 30 dni po tretiranju.

FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v poškodovanih posevkih in v posevkih, ki so oslabljeni od rastlinskih bolezni, škodljivcev, mraza ali stoječe vode, lahko deluje fitotoksično.

KARENCA: Karenca za pšenico, ječmen, tritikalo in rž je zagotovljena s časom uporabe.

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.