



**4. UPORABA: IMPACT lahko uporabljamo:**

- **na pšenici** za zatiranje žitne pepelovke (*Blumeria graminis*) in rj (*Puccinia* spp.) v odmerku 1 l/ha (10 ml/100 m<sup>2</sup>). V navedenem odmerku sredstvo tudi zmanjšuje okužbo z listno pegavostjo (*Septoria* spp.), fuzariozami (*Fusarium* spp.) in lomljivostjo žitnih bilk (*Pseudocercospora herpotrichoides*);
- **na ječmenu** za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti (*Pyrenophora teres*) v količini 1 l/ha (10 ml /100 m<sup>2</sup>). Sredstvo v navedenem odmerku zmanjšuje okužbo z ječmenovim listnim ožigom (*Rhynchosporium secalis*);
- **na sladkorni pesi** za zatiranje pesne listne pegavosti (*Cercospora beticola*) v odmerku 0,5-0,75 L/ha (5-7,5 ml/100m<sup>2</sup>).

Tretiramo ob porabi 200 - 300 l vode / ha oziroma 3 l / 100 m<sup>2</sup>.

**OPOZORILA: IMPACT lahko uporabimo največ 2 krat letno na isti površini.**

Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in vodnih izvirov s tem, da tretiramo najmanj 20 m od njih.

**5. STRUPENOST: IMPACT je strupen za ljudi, ribe in toplokrvne živali in po vsebnosti aktivne snovi je razvrščen v 3. skupino strupov.**

Proizvajalec je dolžan, da strupenost sredstva vidno označi na embalaži in v navodilu.

**6. KARENCA: 35 dni za žita in sladkorno peso.**