

2. UPORABA:

FFS MANFIL 75 WG se uporablja kot preventivni kontaktni fungicid na:

a) na **trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja** za zatiranje **peronospore vinske trte (*Plasmopara viticola*)** v največjem dovoljenem odmerku 2 kg na ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dva krat v eni rastni dobi, v fenološki fazi od razvitega prvega lista do zapiranja grozdov (BBCH 11-79). Tretira se v časovnih intervalih 7 - 10 dni, odvisno od količine padavin in prirastka zelene mase.

b) na **jablanah** za zatiranje **jablanovega škrlupa (*Venturia inaequalis*)** v največjem dovoljenem odmerku 2 kg na ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi, v fenološki fazi od brstenja do zorenja (BBCH 51-79).

c) na **krompirju** za zatiranje **krompirjeve plesni (*Phytophthora infestans*)** v največjem dovoljenem odmerku 2 kg/ha (20 g/100 m²). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ osemkrat v eni rastni dobi. Prvič se tretira preden se vrste sklenejo (BBCH od 30 dalje). Tretira se vsakih 7-10 dni, odvisno od količine padavin in prirastka zelene mase.

d) na **paradižniku** za zatiranje **paradižnikove plesni (*Phytophthora infestans*)** v največjem dovoljenem odmerku 2 kg/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču paradižnik tretira največ petkrat. Tretira se v fenološki fazi od razvitega 4. lista do začetka zorenja plodov (BBCH 14-88). Tretira se vsakih 7-10 dni, odvisno od količine padavin in prirastka zelene mase.

OPOZORILA: Uporaba sredstva v zaščitnih prostorih ni dovoljena.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline.

KARENCA: Karenca 3 dni za paradižnik (na prostem), 7 dni krompir, 28 dni za jabolane ter za trto za pridelavo vinskega in namiznega grozdja.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov *mankozeb* za jabolka, vinsko in namizno grozdje, krompir ter paradižnik so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE:

Sredstvo MANFIL 75 WG se označi in razvrsti kot:

Xn	Zdravju škodljivo. Sk. Razmn. 3.
N	Okolju nevarno.
R43	Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R63	Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.
R50/53	Zelo strupeno za vodne organizme / lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
S2	Hraniti izven dosega otrok.
S13	Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
S24	Preprečiti stik s kožo.
S36/37	Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.
S46	Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
S61	Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Proizvajalec je dolžan, da nevarnost sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o spremembi obvestiti pristojni organ.

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 20 m tlorisne širine od meja brega voda 1. in 2. reda pri tretiranju jablan. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meja brega voda 1. in 2. reda pri tretiranju trte. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meja brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meja brega voda 2. reda pri tretiranju krompirja in paradižnika.

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor, se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije ter se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Pokliče se zdravnika in se mu pokažemo originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Prizadeta oseba naj popije 2 dl vode. Pokliče se zdravnika. Osebi z moteno zavestjo se ne daje piti ničesar, niti se ne sme izzivati bruhanja.

Pri stiku s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom.

Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in oči temeljito spere s čisto vodo. Če draženje oči ne mine, se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno v skladu s splošnimi ukrepi.

Navodilo zdravniku: V primeru zaužitja naj prisebna oseba popije aktivno oglje (1 g na kg telesne teže) razredčeno z vodo v razmerju 1:4. V primeru zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca. Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni.