

## 2. UPORABA:

Sredstvo MELODY COMBI WG 65,3 se uporablja kot sistemični in kontaktni fungicid za preventivno tretiranje **trte za pridelavo vinskega grozdja** za zatiranje **peronospore vinske trte (*Plasmopara viticola*)** v 0,15 % koncentraciji pri porabi vode 1000 L/ha oziroma v odmerku 1,5 kg na ha. Tretiranja se opravi v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe oziroma ob nastopu ugodnih razmer za razvoj bolezni v presledkih 10-14 dni. Ob močnejšem pritisku bolezni se presledke lahko skrajša na 7-10 dni.

**OPOZORILA:** Zaradi preprečevanja razvoja odpornosti (rezistence) je uporaba sredstev, ki vsebujejo aktivno snov *iprovalikarb*, na istem zemljišču dovoljena največ trikrat v eni rastni sezoni.

**FITOTOKSIČNOST:** Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili za uporabo.

**KARENCA:** Karenca za trto za pridelavo vinskega grozdja je 35 dni.

**MEJNA VREDNOST OSTANKOV:** Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivni snovi *folpet* in *iprovalikarb* so za vinsko grozdje v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

## 3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo MELODY COMBI WG 65,3 se razvršča in označi kot:

|           |   |
|-----------|---|
| Xn        | Zdravju škodljivo. Rakotvorno 3. skupine.   |
| N         | Okolju nevarno.   |
| R38       | Draži kožo.   |
| R40       | Možen rakotvoren učinek.  |
| R41       | Nevarnost hudih poškodb oči.  |
| R43       | Lahko povzroči preobčutljivost.   |
| R50       | Zelo strupeno za vodne organizme.   |
| S2        | Hraniti izven dosega otrok.   |
| S26       | Če pride v oči takoj izprati in poiskati zdravniško pomoč.                              |
| S36/37/39 | Uporabljati zaščitno obleko, rokavice in očala/zaščito za obraz.                        |
| S46       | Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. |
| S61       | Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.             |

Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS.

**OPOZORILA:** Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

**VARSTVO PRI DELU:** Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge, polnjenju rezervoarja, med tretiranjem z ročno oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so visoko nad tlemi ter pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati zaščitne rokavice. Med tretiranjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), masivno obutev in zaščitne rokavice.

## MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

V primeru stika s kožo: Odstraniti je treba kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in milom. V primeru draženja kože se je potrebno posvetovati z zdravnikom.

V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci ter oko 15 min spira s čisto vodo. Če draženje ne mine, se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih.

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Prizadeta oseba naj popije do 2 dl vode. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Takoj se pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

Zdravniška pomoč: V primeru zaužitja sredstva naj prisebna oseba popije aktivno oglje (1 g/kg telesne teže) razredčeno z vodo v razmerju 1:4. V primeru zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca. Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni.