

4. UPORABA:

a) **Sadjarstvo:**

- v času mirovanja do razvojne faze mišjega ušesa (ff C-D) za zatiranje **ameriškega kaparja** (*Comstocaspis perniciososa*) in drugih **kaparjev** (*Coccina*) ter za zatiranje zimskih jajčec **rdeče sadne pršice** (*Panonychus ulmi*) v 4 % koncentraciji (400 ml na 10 l vode) na **pečkatem sadnem drevju** in v 3 % koncentraciji (300 ml na 10 l vode) na **koščičastem sadnem drevju**. Rastline je potrebno dobro omočiti.

- **na pečkatem in koščičastem sadnem drevju** v rastni dobi proti **rdeči sadni pršici** (*Panonychus ulmi*), **listnim ušem** (*Aphididae*) in **kaparjem** (*Coccina*) v odmerku 10 l/ha na 1 m višine krone (100 ml na 1 m višine krone na 100 m²). Opravimo do 3 škropljenja v rastni dobi.

- proti **pršicam šiškaričam** (*Eriophyidae*) v času selitve v odmerku 10 l/ha na 1 m višine krone (100 ml na 1 m višine krone na 100 m²). Škropimo v presledkih 7 do 10 dni. Opravimo 3 škropljenja v rastni dobi.

b) **Vinogradništvo:**

- proti **rdeči sadni pršici** (*Panonychus ulmi*) proti zimskim jajčecem in prvim ličinkam in **pršicam šiškaričam** (*Eriophyidae*) v odmerku 8 l/ha (80 ml na 100 m²). Škropimo v razvojni fazi C-D (volna do prvi lističi). Rastline je potrebno dobro omočiti.

c) **Vrtnine:**

- **v kapusnicah** (nad 50cm) proti **mokasti kapusovi uši** (*Brevicoryne brassicae*) v 2% koncentraciji (200 ml na 10 l vode) ob porabi 600-800 l škropilne mešanice na ha. Škropimo v presledkih 7 do 10 dni in sicer do 3 krat v rastni dobi.

- **v fižolu** proti **navadni pršici** (*Tetranychus urticae*) v 2 % koncentraciji (200 ml na 10 l vode) ob porabi 600 l škropilne mešanice na hektar (6 l na 100m²) za nizek, grmičast fižol in 800 l na hektar (8 l na 100 m²) za visok fižol. Škropimo do 2 krat v rastni dobi.

- **v ostalih vrtninah** na prostem in pod steklom večjih od 125 cm proti **rastlinjakovemu ščitkarju** (*Trialeurodes vaporariorum*) v 2 % koncentraciji (200 ml na 10 l vode) ob porabi 700 l škropilne mešanice na hektar (7 l na 100 m²). Škropimo v 7 do 10 dnevni presledkih in sicer do 6 krat v rastni dobi.

d) **Okrasne rastline (iglavci, vrtnice itn.)** na prostem in pod steklom:

- proti **pršicam prelkam** (*Tetranychidae*), **kaparjem** (*Coccina*), **listnim ušem in ušem na smrekah** (*Aphididae*), **rastlinjakovemu ščitkarju** (*Trialeurodes vaporariorum*) v 2 % koncentraciji (200 ml na 10 l vode) ob porabi 700-900 l škropilne mešanice na ha (7-9 l na 100 m²). Škropimo v 7 do 10 dnevni presledkih in sicer največ 3 krat v rastni dobi.

e) Kot **dodatek insekticidom** še posebej za zatiranje **navadne hruševe bolšice** (*Cacopsylla pyri*) in **krvave uši** (*Eriosoma lanigerum*) za povečanje učinkovitosti v 0,5% koncentraciji (50 ml na 10 l vode).

f) Kot **dodatek herbicidom** za izboljšanje delovanja v odmerku 0,5 -2 l/ha, odvisno od herbicida in kulture, v kateri ga uporabljamo:

- herbicidom na osnovi sulfonilsečnine dodamo 1-2 l/ha (10-20 ml na 100 m²);

- herbicidom za uporabo v sladkorni pesi dodamo 0,5-2 l/ha (5-20 ml na 100 m²).

OPOZORILA:

Pri škropljenju se mora preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov s tem, da

škropimo najmanj 20 m od njih.

FITOTOKSIČNOST: Pripravek je lahko fitotoksičen za okrasne rastline.

5. STRUPENOST: Pripravek OGRIOOL se ne razvršča med nevarne pripravke.

Standardni obvestilni znaki so: S 2 - 13 - 37/39.

6. KARENCA: Karence ni.