

2. UPORABA:

Sredstvo PLANTELLA TOTAL se uporablja kot sistemski herbicid v nasadih sadnega drevja ter vinske trte, na strniščih in na nekmetijskih zemljiščih za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevla, navadnega regrata (*Taraxacum officinale*), njivskega osata (*Cirsium arvense*), njivskega slaka (*Convolvulus arvensis*) in topolistne kislice (*Rumex obtusifolius*). Sredstvo se uporablja z ročno škropilnico za zatiranje:

- enoletnega plevla se uporabi 20 ml na 1,25 L vode – navedena količina škropilne brozge je namenjena za površino 22 m²;
- večletnega plevla se uporabi 20 ml na 1,25 L vode – navedena količina škropilne brozge je namenjena za površino 11 m².

OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni. Najboljši učinek se doseže, ko ima plevel večjo listno površino za sprejem sredstva, to je v času ko plevel intenzivno raste. Učinkovitost tretiranja se lahko zmanjša, če prej kot 6 ur po tretiranju dežuje. Učinek tretiranja je odvisen od vremenskih razmer in vrste plevla ter se pokaže šele po nekaj dneh ali vse do 4 tedne po tretiranju. Sredstvo ne zatira preslic (*Equisetum* sp.) in navadne regačice (*Aegopodium podagraria*). Tretiranje se izvede, ko je ozračje mirno, da se izognemo zanašanju sredstva na sosednje neciljne rastline. Sredstvo se ne sme uporabljati v sadovnjakih mlajših od dveh let. Pri tretiranju pod sadnim drevjem in vinski trto je potrebno uporabiti ščitnik, da se prepreči zanašanje sredstva na neciljne rastline.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo je škodljivo za rastlin (fitotoksično), če pade na liste ali zelene dele gojenih rastlin.

MEŠANJE: Ne priporoča se mešanja z drugimi fitofarmaceutskimi sredstvi.

KARENCA: Karenca za sadovnjake in vinograde je 35 dni.

DELOVNA KARENCA: Na tretirane površine je dovoljen dostop ljudem, ko se sredstvo na listju popolnoma posuši.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za aktivno snov *glifosat* za sadje in grozdje je v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo PLANTELLA TOTAL se razvršča in označi kot:

S2	Hraniti izven dosega otrok.
S13	Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
S20/21	Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.
S36/37	Med delom nositi primerno zaščitno obleko in rokavice. Vsebuje Proxel GXL. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.
SP1	Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS.

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak, se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije ter se jo zavaruje pred mrazom in vročino. Takoj je potrebno poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

V primeru stika s kožo: Takoj je potrebno sleči kontaminirano obleko ter kožo temeljito umiti z vodo in milom.

V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in oči temeljito spere s čisto vodo. V primeru draženja se je potrebna posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

V primeru zaužitja: Usta se temeljito spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Ponesrečeni naj popije 2 dl. Vode. Osebi z moteno zavestjo se ne da ničesar piti, niti se ji ne izziva bruhanja. Takoj je potrebno poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Pri vdihavanju: Pri vdihavanju se je potrebno ravnati po splošnih ukrepih.

Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. V primeru zaužitja se da prizadeti osebi aktivno oglje in salinično odvajalo. Pri zaužitju večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.