

## 2. UPORABA

Sredstvo POL-SULPHUR 80 WG se uporablja kot *kontaktni fungicid*:

- **na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja** za zatiranje **oidija vinske trte (*Uncinula necator*)** v odmerku 4 kg/ha (40 g/100 m<sup>2</sup>). Tretira se v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin oziroma od razvojne faze 5 do 8 razvitih listov (BBCH 15-18), do razvojne faze, ko se večina jagod med seboj dotika (BBCH 79). Na istem zemljišču se v eni rastni sezoni lahko tretira največ 8 krat, v razmiku 7 do 10 dni, ki se jih po potrebi prilagaja pritisku bolezni. Priporočena količina vode je do 1000 L/ha (do 10 L/100 m<sup>2</sup>).
- **v sladkorni pesi** za zatiranje **pesne pepelaste plesni (*Erysiphe betae*)** v odmerku 6,0-7,5 kg/ha (60-75 g/100 m<sup>2</sup>), preventivno ali takoj po pojavu bolezni. Tretira se v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin. Na istem zemljišču se v eni rastni sezoni lahko tretira največ 2 krat, v razmiku 10-14 dni. Priporočena količina vode je 200-400 L/ha (2-4 L/100 m<sup>2</sup>).

### OPOZORILA:

Sredstvo POL-SULPHUR 80 WG se uporablja pri temperaturah zraka od 15 do 25°C. Uporabo v času polnega cvetenja se odsvetuje.

Učinkovitost fitofarmacevtskega sredstva POL-SULPHUR 80 WG pri uporabi na trti v odmerku 4 kg/ha je bila preverjena le v razmerah zelo nizkega pritiska bolezni, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva POL-SULPHUR 80 WG v razmerah srednjega ali visokega pritiska bolezni prevzame uporabnik fitofarmacevtskega sredstva.

*KOLOBAR: Ni nobenih omejitev za rastline, ki sledijo v kolobarju.*

**FITOTOKSIČNOST:** Sredstvo ni fitotoksično za zgoraj navedene gojene rastline, če se uporablja v skladu z navodili za uporabo. Sredstvo je lahko fitotoksično, če se ga uporablja pri temperaturah zraka višjih od 25°C.

**ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA:** Sredstvo POL-SULPHUR 80 WG vsebuje aktivno snov *žveplo*. Tveganje za razvoj rezistence je majhno. Dodatne informacije so vam na voljo na [www.frac.info](http://www.frac.info). Pri večletni zaporedni uporabi fungicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni organizmi preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba fungicidov z različnimi načini delovanja.

**KARENCA:** 5 dni za trto, 10 dni za sladkorno peso.

**MEŠANJE:** V primeru mešanja sredstva z drugimi sredstvi se posvetujte z imetnikom registracije oziroma distributerjem.

**MEJNA VREDNOST OSTANKOV:** Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov *žveplo* niso potrebne.

## 3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo POL-SULPHUR 80 WG se **razvršča in označi** kot:

**Piktogrami GHS:** /  
**Opozorilne besede:** /  
**Stavki o nevarnosti:** /

**Kategorija:** /

**Dodatne informacije o nevarnosti:**

EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

**Previdnostni stavki - preprečevanje:**

P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

**Previdnostni stavki - odziv: /**

**Previdnostni stavki - odstranjevanje:**

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

**Dodatni stavki:**

SP 1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

**OPOZORILA:** Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

**VARSTVO PRI DELU:** Pri ravnanju s koncentriranim sredstvom, med mešanjem škropilne brozge, pri polnjenju oz. čiščenju rezervoarja, med škropljenjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico/pršilnikom ter med škropljenjem z ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), predpasnik, zaščitne rokavice, trpežno obutev ter pokrivalo (klobuk s širokimi kraji). Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače).

**DELOVNA KARENCA:** Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko ostanki škropiva na rastlinah niso več vidni.

**PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:**

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzivati bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. Če se pojavijo znaki draženja, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in oči temeljito spere s čisto vodo. Odstrani se kontaktne leče, če jih imamo in če to lahko storimo brez težav. Nadaljuje se z spiranjem. V primeru draženja oči se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri vdihavanju: Ravna se v skladu s splošnimi ukrepi.

Nujna zdravniška pomoč: Ne izpira se želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salnično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je simptomatično. Specifični antidot ni poznan.