

» 4. UPORABA: QUADRIS se uporablja:

- **v vinogradih** za zatiranje **oidija vinske trte** (*Uncinula necator*), **peronospore vinske trte** (*Plasmopara viticola*), **črne pegavosti vinske trte** (*Phomopsis viticola*) in **rdečega listnega ožiga vinske trte** (*Pseudopeziza tracheiphila*) v 0,075 % - 0,1 % koncentraciji (7,5 ml do 10 ml na 10 l vode) ali 0,75 l/ha do 1 l/ha (7,5 ml do 10 ml na 100 m²) pred začetkom cvetenja in po koncu cvetenja, v 10 do 12 dnevni razmikih, odvisno od pogojev za razvoj bolezni. Da bi dosegli dober učinek, se priporoča uporaba pred pojavom bolezni (preventivno).
- **na bučnicah z užitno in neužitno lupino** za zatiranje **pepelovke bučnic** (*Erisiphe orontii*, *Sphaeroteca fusca*, *Sphaeroteca fuliginea*) v 0,075 % koncentraciji (7,5 ml na 10 l vode na 100 m²) in **kumarne plesni** (*Pseudoperonospora cubensis*), za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu **Didymella** v 0,075 – 0,1 % koncentraciji (7,5 – 10 ml na 10 l vode na 100 m²).
- **na korenju** za zatiranje **korenjevega listnega ožiga** (*Alternaria dauci*) v odmerku 1 l/ha (10 ml na 100 m²).
- **na spomladanski čebuli** za zatiranje **čebulne plesni** (*Peronospora destructor*) v odmerku 1 l/ha (10 ml na 100 m²).
- **na čebuli, šalotki in česnu** za zatiranje **čebulne plesni** (*Peronospora destructor*) v odmerku 1 l/ha (10 ml na 100 m²).
- **na poru** za zatiranje **papirnate bolezni pora in čebule** (*Phytophthora porri*) in **porove škrlatne pegavosti** (*Alternaria porri*) v odmerku 1 l/ha (10 ml na 100 m²).
- **na drobnjaku** za zatiranje **porove škrlatne pegavosti** (*Alternaria porri*) in **čebulne rje** (*Puccinia allii*) v odmerku 1 l/ha (10 ml na 100 m²).
- **na paradižniku, jajčevcih in papriki** za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu *Alternaria*, *Peronospora* in *Phytophthora*, **krompirjeve plesni** (*Phytophthora infestans*) in **paradižnikove pepelovke** (*Leveillula taurici*) v odmerku 1 l/ha (10 ml na 100 m²).
- **na jajčevcih in papriki** za zatiranje **paradižnikove pepelovke** (*Leveillula taurici*) v odmerku 1 l/ha (10 ml na 100 m²).
- **na beluših** za zatiranje **beluševe rje** (*Puccinia asparagi*) in **beluševe rjave pegavosti** (*Stemphylium spp.*) v odmerku 1 l/ha (10 ml na 100 m²). Uporaba je dovoljena v mladih nasadih belušev, kjer se pridelek še ne pobira. V rodni nasadih je uporaba dovoljena samo po spravi pridelka, to je od sredine junija do sredine septembra.
- **na jagodah** za zatiranje **jagodne pepelovke** (*Sphaerotheca macularis*) v odmerku 0,8 – 1 l/ha (8-10 ml na 100 m²).
- **na okrasnih rastlinah** za zatiranje **pepelovk in rj** v 0,1 % koncentraciji (10 ml na 10 l vode) ali 1 l/ha (10 ml na 100 m²).

OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ štirikrat v rastni sezoni, pri čemer ga lahko zaporedoma uporabimo največ dvakrat. Uporaba nižjega odmerka se priporoča, ko so vremenski pogoji za razvoj bolezni neugodni oziroma so posledki med tretiranjem manjši od 7 dni. Ne smemo ga uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu (temperatura zraka nad 30°C, hitrost vetra nad 5 m/s).

Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov s tem, da tretiramo najmanj 20 m od njih.

MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša s fungicidi za zatiranje sive plesni (*Botryotinia fuckeliana*).

FITOTOKSIČNOST: Potrebno je preprečiti zanašanje sredstva, ker je fitotoksično za nekatere sorte jablan.

6. KARENCA: Karenca je 21 dni za vinsko trto; 14 dni za korenje, spomladansko čebulo, čebulo, šalotko, česen, drobnjak in por; 3 dni za bučnice z užitno in neužitno lupino ter paradižnik, jajčevce, papriko in jagode; za beluše je zagotovljena s časom uporabe.