

4. UPORABA: RACER 25 - EC se uporablja za zatiranje večine vrst širokolistnega in nekaterih vrst travnega plevla:

- **v sončnicah**, škropi se takoj po setvi pred vznikom v odmerku 2 - 4 l/ha (20 - 40 ml na 100 m²), odvisno od tipa tal;

- **v krompirju**,

- takoj po sajenju v odmerku 2 - 4 l/ha (20 - 40 ml na 100 m²), odvisno od vrste tal;
- v primeru kombinacije z drugimi pripravki zaradi razširitve delovanja na posamezne ozkolistne in širokolistne plevle v odmerku 1 - 2 l/ha (10 - 20 ml na ha na 100 m²), škropi se po sajenju krompirja;

- **v koruzi**: škropi se po setvi pred vznikom koruze:

- v odmerku 2-3 l/ha (20 - 30 ml na 100 m²);
- v primeru kombinacije z drugimi pripravki zaradi razširitve delovanja na posamezne ozkolistne in širokolistne plevle ga uporabimo v odmerku 1 - 2 l/ha (10 - 20 ml na 100 m²);

- **v sadovnjakih in vinogradih**,

- **v mladih sadovnjakih in vinogradih** starih 1 - 3 leta, v odmerku 1 - 3 l/ha (10 - 30 ml na 100 m²);
- **v sadovnjakih in vinogradih**, starejših od 4 let, v odmerku 2-3 l/ha (20- 30 ml na 100 m²).

V sadovnjakih in vinogradih se škropi spomladi pred ali takoj po vzniku plevla ob porabi vode 300 - 400 l/ha (3 - 4 l na 100 m²) z opombo, da pri škropljenju pripravek ne sme pasti na listno površino gojenih rastlin, saj lahko deluje fitotoksično.

Poraba vode pri drugih gojenih rastlinah, razen v sadovnjakih in vinogradih, je 300 - 600 l/ha (3 - 6 l vode na 100 m²).

OPOZORILA : Sredstva se ne sme uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu. Preprečiti se mora zanašanje sredstva na zelene dele sosednjih gojenih rastlin. RACER 25- EC se lahko uporabi samo 1 krat letno na isti površini.

Pri tretiranju se mora preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in vodnih izvirov s tem, da se tretira 20 m od njih.

MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša z nekaterimi herbicidi, da se razširi spekter delovanja. Pred uporabo se je treba posvetovati s strokovno službo.

FITOTOKSIČNOST: Če ob škropljenju pade sredstvo na listno površino gojene rastline (sadoxnjaki in vinogradi), lahko pride do fitotoksičnosti. Sredstvo je lahko fitotoksično za sončnice in krompir na humidnih območjih v času obilnih padavin (zastoj v rasti, kloroze, redko deformacije). Ne priporoča se uporaba na lahkih tleh.

5. NEVARNOST: RACER 25-EC se razvršča med nevarne pripravke, kot:

Xn Zdravju škodljivo.

N Okolju nevarno.

R10 Vnetljivo.

R36 Draži oči.

R62 Možna nevarnost oslabitve plodnosti.

R63 Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.

R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

- R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme; lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
- S2 Hraniti izven dosega otrok.
S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
S60 Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.
S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in etiketo.

Proizvajalec je dolžan, da strupenost sredstva vidno označi na embalaži in v navodilu.

6. KARENCA: Karenca je 63 dni za krompir in silažno koruzo, za grozdje, sadje, sončnice in koruzo v zrnju je zagotovljena s časom uporabe.