

2. UPORABA:

ROUNDUP ULTRA se uporablja kot sistemski neselektivni herbicid za zatiranje **večletnega plevela z globokimi koreninami ter enoletnega in dvoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela** v odmerku 2 - 10 L/ha in sicer:

a) na strniščih, v sadovnjakih in vinogradih za zatiranje:

- enoletnega plevela v odmerku 2 - 4 L/ha (20 - 40 ml na 100 m²);
- plazeče pirnice (*Elymus repens*) v odmerku 2,5 - 3,5 L/ha (25 - 35 ml na 100 m²), ko doseže višino 25 - 30 cm;
- prstastega pesjaka (*Cynodon dactylon*) v odmerku 8 - 10 L/ha (80 - 100 ml na 100 m²);
- ostric (*Cyperus* spp.) v odmerku 5 L/ha (50 ml na 100 m²);
- divjega sirka (*Sorghum halepense*), njivskega osata (*Cirsium arvense*), kodrolistne kislice (*Rumex crispus*), topolistne kislice (*Rumex obtusifolius*) in alpske kislice (*Rumex alpinus*) v odmerku 3,5 - 5 L/ha (35 - 50 ml na 100 m²);
- njivskega slaka (*Convolvulus arvensis*) v času cvetenja v odmerku 6 - 8 L/ha (60 - 80 ml na 100 m²) z dodatkom močila.

Navedene odmerke se uporablja ob porabi vode 100 - 200 L/ha (1 - 2 L na 100 m²). Če so rastline večje se tretira, ko ima plevel razvite dovolj listne mase.

b) za jesensko tretiranje v sadovnjakih in vinogradih po obiranju sadja oziroma grozdja v odmerku 1,5 - 2 L/ha (15 - 20 ml na 100 m²).

c) pred setvijo koruze, sladkorne pese, krompirja in vrtnin v odmerku 2 L/ha ob uporabi vode 150 - 200 L/ha (20 ml na 1,5 - 2 L vode na 100 m²) 7 - 10 dni pred setvijo.

d) za obnovo travnikov in pašnikov se tretira v času intenzivne rasti v odmerku 2-3 L/ha (20-30 ml na 100 m²) za enoletni plevel in 4 L/ha (40 ml na 100 m²) za večletni plevel, ob upoštevanju pogoja, da se paša in košnja lahko prične 7 dni po tretiranju. Travo se sme ponovno sejati 14 dni po tretiranju.

e) na neobdelovalnih površinah v odmerku 4-8 L/ha ob porabi 200-400 L vode na ha (40-80 ml na 2-4 L vode na 100 m²), tretira se v času bujne rasti.

f) v gozdnih drevesnicah:

- tretira se v času bujne rasti med vrstami z uporabo ščitnika v odmerku 4,5 L/ha ob porabi vode 400 L/ha (45 ml v 4 L vode na 100 m²), tretira se z nizkim pritiskom;
- sadike smreke in bora, tretira se celo površino v odmerku 6 L/ha ob porabi vode 400 L/ha (60 ml v 4 L vode na 100 m²) in sicer spomladi (marec-april) ali jeseni (september-oktober) oziroma v času mirovanja iglavcev in plevela.

g) za zatiranje koreninskih izrastkov in poganjkov iz panjev listavcev s premazovanjem panjev takoj po sekanju dreves v obdobju od maja do decembra s 15 % raztopino sredstva (1,5 L v 10 L vode).

h) v mladih nasadih iglavcev za zatiranje drevesnega plevela in sicer:

- tretira se v času vegetacije z 1,5 % koncentracijo (75 ml na 5 L vode na 100 m²) ob porabi vode 300 L/ha, z uporabo ščitnika za zaščito sadik iglavcev, ali
- tretira se celo površino v začetku jeseni, ko sadike zaključujejo rast, z 1 % koncentracijo (50 ml na 5 L vode na 100 m²) ob porabi 300 L vode na ha.

i) po goloseku gozdov za pripravo površin za sajenje:

- tretira se koreninske izrastke in druge poganjke v času intenzivne rasti z 1 % koncentracijo (50 ml na 5 L vode na 100 m²) ob porabi vode 300-500 L/ha;
- tretira se panje takoj po poseku dreves v obdobju od avgusta do oktobra s 5 % koncentracijo (250 ml na 5 L vode na 100 m²) ob porabi vode 300 L/ha in pod pogojem, da se uporabi največ 5 L sredstva na ha. S sredstvom se ne sme tretirati po celi površini, ampak se panje tretirata samo točkovno.

OPOZORILA: Preprečiti je potrebno zanašanje sredstva na zelene in mlade dele gojenih rastlin. Ne sme se ga uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu. Sredstvo se lahko na istem zemljišču na kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih uporablja največ dvakrat v eni rastni sezoni. Sredstvo se ne sme uporabljati sadovnjakih mlajših od dveh let in vinogradih mlajših od štirih let. Na tretiranih zemljiščih je prepovedana paša živine za prirajo mleka, kakor tudi krmljenje s senom s tretiranih površin. Ostala živina se lahko pase in krmi s tretiranim senom 7 dni po tretiranju. Sredstva se ne sme uporabljati uporabljati za desikacijo soje in krompirja. Za zatiranje plevela pred setvijo v korenovkah se ne sme uporabljati dodatnih močil.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo je fitotoksično za zelene dele gojenih rastlin.

KARENCA: Karenca za sadovnjake in vinograde je 35 dni, za ostale namene je zagotovljena z načinom uporabe.

MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša z drugimi herbicidi.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo ROUNDUP ULTRA se razvrsti in označi kot:

S2 Hraniti izven dosega otrok.

S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

SP1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

SPe 3 Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati netretiran varnostni pas v skladu s predpisi o varovanju površinskih voda.

Proizvajalec je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o spremembi obvestiti pristojni organ.

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. Zaradi strupenosti za ribe se sredstva ne sme uporabljati za zatiranje vodnega plevela.

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak, se jo zavaruje pred mrazom in se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

Pri zaužitju: Usta se takoj spere z vodo. Ne izziva se bruhanja. Takoj je potrebno poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

Pri stiku s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo se dobro umije z vodo in milom. Če se pojavijo znaki draženja se pokliče zdravnika.

Pri stiku z očmi: S prstom in kazalcem se razpre očesni vek in oko 15 min spira s čisto vodo. V primeru draženja oči se je potrebno posvetovati z zdravnikom.

Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih.

Navodilo zdravniku: Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatsko.