

2. UPORABA

Sredstvo TAROT 25 WG se uporablja kot sistemski herbicid za zatiranje **ozkolistnega in širokolistnega plevla** v:

1. **koruzi** po vzniku posevka:

- za zatiranje nekaterih vrst **širokolistnega plevla** kot so npr. navadna zvezdica (*Stellaria media*), srhodlakavi ščir (*Amaranthus retroflexus*) in baržunasti oslez (*Abutilon theophrasti*), ter **večletnega ozkolistnega plevla** npr. divji sirek (*Sorghum halepense*) in plazeča pirnica (*Agropyron repens*) v odmerku 50 - 60 g/ha (0,5 – 0,6 g na 100 m²) z obveznim dodatkom ustreznega močila. Tretira se, ko je koruza v fenološki fazi od dva do osem razvitih listov (BBCH 12 do 18), plevel naj ima razvite dva do tri liste.

- za zatiranje nekaterih vrst **širokolistnega plevla** kot so npr. navadna zvezdica (*Stellaria media*), srhodlakavi ščir (*Amaranthus retroflexus*) in baržunasti oslez (*Abutilon theophrasti*), ter **enoletnih ozkolistnih plevelov** kot so npr. kostreba (*Echinochloa* spp.), srakonje (*Digitaria* spp.) in muhviči (*Setaria* spp.) v odmerku 40 - 50 g/ha (0,4 – 0,5 g na 100 m²) z obveznim dodatkom ustreznega močila. Tretira se, ko je koruza v fenološki fazi od dva do osem razvitih listov (BBCH 12 do 18), plevel naj ima razvite dva do tri liste.

2. **krompirju** po vzniku posevka:

- za zatiranje nekaterih vrst **širokolistnega plevla ter enoletnega ozkolistnega plevla** razen navadne kostrebe (*Echinochloa crus-galli*) v odmerku 40 g/ha z obveznim dodatkom ustreznega močila. Tretira se, ko je krompir v fenološki fazi od treh listov dalje in najpozneje v stadiju začetka sklepanja vrst (BBCH 103 do 301). V času tretiranja naj ima plevel razvite dva do tri liste.

- za zatiranje nekaterih vrst **širokolistnega plevla ter enoletnega ozkolistnega plevla** vključno z navadno kostrebo (*Echinochloa crus-galli*) ter **večletnega ozkolistnega plevla** v odmerku 50 g/ha z obveznim dodatkom ustreznega močila. Tretira se, ko je krompir v fenološki fazi od treh listov dalje in najpozneje v stadiju začetka sklepanja vrst (BBCH 103 do 301). V času tretiranja naj ima plevel razvite dva do tri liste.

OPOZORILA:

- Če v posevku prevladuje širokolistni plevel, zgolj uporaba tega sredstva ni dovolj učinkovita.
- Herbicidno delovanje je boljše v vlažnem in toplem vremenu. Hladne in suhe vremenske razmere lahko zmanjšajo učinkovitost sredstva.
- Sredstvo se ne sme uporabljati v starševskih linijah za hibridno semensko koruso. Odsvetuje se uporabo v voščenih hibridih, sladki koruzi, pokovki, semenski koruzi in semenskem krompirju.
- Če je bilo koruzno polje tretirano z organskimi fosfornimi insekticidi, se odsvetuje tretiranje s tem sredstvom oziroma naj bo presledek med tretiranjem z insekticidom in TAROT 25 WG vsaj 14 dni.
- TAROT 25 WG se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi in krompirju največ enkrat v eni rastni sezoni.
- Če je koruza zaradi kakršnih koli vzrokov v stresu, se odsvetuje tretiranje s tem sredstvom.
- Po tretiranju korusi s tem sredstvom ne sme deževati vsaj dve uri, v nasprotnem primeru je učinek sredstva lahko zmanjšan.
- Sredstva se ne sme uporabljati pri temperaturi nad 25 °C oziroma če je temperatura ponoči pred tretiranjem pod 6 °C.
- Priporoča se enakomerno setev korusi - na težki zemlji naj bo globina setve 4 cm, na lahki pa 6 cm.
- V primeru propada posevka tretiranega s sredstvom TAROT 25 WG se v roku 3 mesece po tretiranju sme sejati na isto površino le koruso, krompir, paradižnik in ozimno pšenico. Površino je pred setvijo potrebno preorati.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ni fitotoksično za navedene gojene rastline. Hibridi korusi, za katere sredstvo ni fitotoksično: achat, aida, aixx, amadeus, anjou 285, anjou 387, ariete, banguy, bibop, boss, bungy, carlos, celtis, city, contesa, dekalb 300, DK 315, DK 6040, DKC 5856, etandart, helix, hifi, ibisco, landia, larin, laura, LG 2276, lola, lorena, M 15, madrigal, magister, moncada, PR 37415, PR 38h20, PR 38h22, prisma, spazio, tixxus – duo, valido waxy in volga. Sorte krompirja, za katere sredstvo ni fitotoksično: batik, cilena, linda, quarta, selma, arfa, laura, primura, concurrent, jaerla, primura, desiree, heme and roda. Pred uporabo sredstva v ostalih hibridih korusi in sortah krompirja se je potrebno glede fitotoksičnosti posvetovati z zastopnikom.

KOLOBAR: Po spravilu koruze in krompirja tretiranega s sredstvom TAROT 25 WG se sme v istem koledarskem letu na isto površino sejati le ozima žita. Naslednje leto po tretiranju glede izbora gojenih rastlin ni omejitev.

MEŠANJE: Ne priporoča se mešanje sredstva z izrazito alkalnimi sredstvi, ker je TAROT 25 WG občutljiv na hidrolizo. Sredstva se ne sme mešati z organskimi fosfornimi insekticidi.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov *rimсульuron* za koruzo in krompir je v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo TAROT 25 WG se razvršča in označi kot:

| | |
|--------|---|
| N | Okolju nevarno. |
| R50/53 | Zelo strupeno za vodne organizme / lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. |
| S2 | Hraniti izven dosega otrok. |
| S60 | Snov in embalažo odstraniti ko nevaren odpadek |
| S61 | Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. |

Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS.

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. Sredstva se ne sme uporabljati na kraških in prepustnih tleh.

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom in vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Potrebno je poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

V primeru stika s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in milom.

V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in oči temeljito spere s čisto vodo. Če draženje ne mine, se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih.

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Prizadeta oseba naj popije 2 dl vode. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Poklicati je potrebno zdravnika.

Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni.