

2. UPORABA

Sredstvo VELUM PRIME se uporablja kot sistemski nematocid, ki ima hkrati tudi fungicidno delovanje. Uporablja se na **paradižniku, jajčevcu, papriki, kumarah, bučah, bučkah, dinjah in lubenicah** v zaščitnih prostorih za zmanjševanje populacije **ogorčic koreninskih šišk (*Meloidogyne* spp.)**. Sredstvo se uporablja samo v sistemu kapljičnega namakanja v odmerku 0,625 L/ha (6,25 mL na 100 m²), največ 2 krat v eni rastni dobi gojene rastline. Sredstvo se prvič uporabi 1-3 dni pred presajanjem ali takoj po presajanju, drugič se ga uporabi 15 do 30 dni po presajanju. Sredstvo ima hkrati tudi fungicidno delovanje, tako da zmanjšuje okužbe s **paradižnikovo pepelovko (*Leveillula taurica*)** na paradižniku in **pepelovke iz rodu *Sphaerotheca* (*Sphaerotheca* sp.)** na bučnicah.

OPOZORILA:

Sredstvo VELUM PRIME se sme uporabljati samo za kapljično namakanje in samo v zaščitnih prostorih. Sredstva se ne sme uporabljati v setvenicah.

FITOTOKSIČNOST: Ob upoštevanju navodil za uporabo sredstvo ni fitotoksično. Znaki fitotoksičnosti se lahko pojavijo na občutljivih sortah kumar. O občutljivosti posameznih sort kumar se pred uporabo sredstva posvetujete s proizvajalcem ali zastopnikom za sredstvo.

KARENCA: za paradižnik, jajčevac, papriko, dinje, buče in lubenice 3 dni; za kumare in bučke 1 dan.

MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmaceutskimi sredstvi ni predvideno.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov *fluopiram* so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo VELUM PRIME se **razvršča in označi** kot:

Piktogrami GHS:



GHS09

Opozorilne besede: /

Stavki o nevarnosti:

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kategorija:

Akut. in kron. za vod. okolje
2, H411

Dodatne informacije o nevarnosti:

EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

EUH208 Vsebuje *1,2-benzizotiazolin-3-on*, *5-kloro-2-metilizotiazol-3-on* in *2 metil-izotiazol-3-on*. Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki - preprečevanje:

P281 Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo.

Previdnostni stavki - odziv:

Previdnostni stavki - shranjevanje:

Previdnostni stavki - odstranjevanje:

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Dodatni stavki:

SP 1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.

VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju ali čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice. Pri stiku s tretirano zemljo/substratom mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in zaščitne rokavice.

DELOVNA KARENCA: Ni potrebna.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca se mora zagotoviti varnost reševalca. Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in se jo zavarujemo pred mrazom oziroma vročino. V primeru nezavesti se jo namesti v položaj za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje po standardnem ABC postopku: sprostitvev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca. Pokliče se zdravnika in se mu predloži navodila za uporabo, etiketo ali varnostni list.

Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzivati bruhanja. Če je možno se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva.

Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in oči temeljito spere s čisto vodo. V primeru draženja oči se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri vdihavanju: Ravna se v skladu s splošnimi ukrepi.

Nujna zdravniška pomoč: Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni.