

4. UPORABA:

Sredstvo lahko uporabljajo izključno osebe, ki so v skladu s predpisi o semenskem materialu kmetijskih rastlin vpisane v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (pravne in fizične osebe, ki pripravljajo semenski material za trg), in ki izpolnjujejo vse zahteve v skladu s predpisi o fitofarmaceutskih sredstvih, imajo na razpolago ustrezne naprave za tretiranje semena ter usposobljene delavce.

VITAVAX 200 FF se uporablja za tretiranje semena pred setvijo:

- a) **pšenice** v odmerku 300 ml na 100 kg semena za zatiranje **pšenične prašate sneti** (*Ustilago tritici*), **pšenične trde sneti** (*Tilletia caries*), **snežne plesni** (*Calonectria graminicola*) in **rjavenja pšeničnih plev** (*Stagonospora nodorum*);
- b) **ječmena** v odmerku 300 ml na 100 kg semena za zatiranje **ječmenove gole sneti** (*Ustilago nuda*), **ječmenove pokrite sneti** (*Ustilago hordei*), **fuzarioz** (*Fusarium spp.*), **ječmenove progavosti** (*Pyrenophora graminea*) in **ječmenove mrežaste progavosti** (*Pyrenophora teres*);
- c) **ovsa** v odmerku 200 ml na 100 kg semena za zatiranje **ovsove prašate sneti** (*Ustilago avenae*), **ovsove temne pegavosti** (*Pyrenophora avenae*) in **fuzarioz** (*Fusarium spp.*);
- d) **koruze** v odmerku 250 - 500 ml na 100 kg semena za zatiranje **fuzarioz** (*Fusarium spp.*), **koruzne bulave sneti** (*Ustilago zaeae*), **progavosti** (*Helminthosporium spp.*), **vrst iz rodu Aspergillus** (*Aspergillus spp.*), **čopičastih plesni** (*Penicillium spp.*) in **padavice** (*Pythium spp.*);
- e) **riža** v odmerku 250 ml na 100 kg semena za zatiranje **riževe helmintosporiozne pegavosti** (*Cochliobolus miyabeanus*), **fuzarioz** (*Fusarium spp.*) in **padavice** (*Pythium spp.*);
- f) **oljne ogrščice** v odmerku 500 ml na 100 kg semena za zatiranje **suhe trohnobe zelja** (*Leptosphaeria maculans*), **fuzarioz** (*Fusarium spp.*), **rizoktonijske padavice** (*Thanatephorus cucumeris*) in **padavice** (*Pythium spp.*).

OPOZORILA: Tretiranega semena se ne sme uporabljati za prehrano ljudi in živali ali za kakršnokoli drugo predelavo ali uporabo, ki ni v skladu z registrirano uporabo. Tretirano seme je potrebno pravilno posejati, da je v celoti pokrito z zemljo. S tretiranim semenom je treba ravnati tako, da ne pride v neposreden stik s čebelami, pticami, ribami in toplokrvnimi živalmi. Ob rokovanju s tretiranim semenom je obvezna uporaba rokavic.

Pri tretiranju in setvi tretiranega semena se mora preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov.

6. KARENCA: Zagotovljena je s časom uporabe.