

2. UPORABA

Sredstvo CENTIUM 36 CS je talni herbicid, namenjen zatiranju nekaterih vrst **ozkolistnega in širokolistnega plevela**.

a) GLAVNE UPORABE:

- v **bučah** se tretira v času po setvi pred vznikom posevka, v odmerku 0,25 L/ha, pri porabi 200 do 300 L vode na ha;

Dobro zatira plevela, kot so npr.: navadna zvezdica (*Stellaria media*), perzijski jetičnik (*Veronica persica*), enoletna latovka (*Poa annua*) in plezajoča lakota (*Galium aparine*).

Zadovoljivo zatira: belo metliko (*Chenopodium album*), poljski jetičnik (*Veronica arvensis*), navadno kostrebo (*Echinochloa crus-galli*) in škrlatno rdečo mrtvo koprivo (*Lamium purpureum*).

Sredstvo ne zatre: navadne rosnice (*Fumaria officinalis*) in njivske vijolice (*Viola arvensis*).

- v **oljni ogrščici** se tretira po setvi oziroma najpozneje 3 dni po setvi in pred vznikom posevka v odmerku 0,25 L/ha, pri porabi 200 do 400 L vode na ha.

Dobro zatira plevela, kot so npr.: navadna zvezdica (*Stellaria media*) in škrlatno rdeča mrtva kopriva (*Lamium purpureum*).

Zadovoljivo zatira: plezajočo lakoto (*Galium aparine*), navadni plešec (*Capsella bursa-pastoris*), belo metliko (*Chenopodium album*) in navadno škrbinko (*Sonchus oleraceus*).

Sredstvo ne zatre: njivskega mošnjaka (*Thlaspi arvense*), njivske vijolice (*Viola arvensis*), perzijskega jetičnika (*Veronica persica*) in prave kamilice (*Matricaria chamomilla*).

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili.

b) MANJŠE UPORABE:

Učinkovitost in fitotoksičnost FFS CENTIUM 36 CS pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS CENTIUM 36 CS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik. Te uporabe so:

- **v strniščni repi in podzemni kolerabi** se sredstvo uporabi neposredno po setvi v odmerku 0,2 L/ha;
- **v podzemni kolerabi** se sredstvo uporabi neposredno po setvi najpozneje do razvojne faze 6 listov (BBCH 16) v deljeni (split) aplikaciji v odmerku 2 krat po 0,1 L/ha;
- **v soji** se sredstvo uporabi neposredno po setvi oziroma najpozneje 3 dni po setvi v odmerku 0,25 L/ha, pri porabi 200 do 400 L vode na ha.

OPOZORILA: Sredstvo se lahko na isti površini uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. Sredstva se ne sme uporabljati na mokrem ali presuhem zemljišču, v času suše ali temperaturne inverzije. Pri tretiranju je treba paziti, da ne pride do zanašanja na sosednje gojene rastline. Od meje tretirane površine do posevka vrtnin, poljščin, trajnih nasadov, drevesnic in ostalih površin, na katerih so neketijske rastline, je treba zagotoviti vsaj dva metra varnostnega pasu.

V primeru propada posevka, ki je bil tretiran s sredstvom CENTIUM 36 CS je treba tla globoko preorati 20 - 30 cm globoko. Kot nadomestne gojene rastline se lahko šest tednov po tretiranju sejejo grah, fižol, krompir, koruza, sončnice, solata, špinača, zelje, jari ječmen, jara pšenica, oves in lucerna.

KOLOBAR: Po pravilu pridelka lahko posevku sledijo rastline, ki so običajne v kolobarju (ozimna pšenica, ozimni ječmen, tritikala, ozimna oljna ogrščica), če je od tretiranja preteklo

vsaj 5 mesecev. Pred setvijo/sajenjem naslednjih posevkov se priporoča preorati tla vsaj do globine 15 cm.

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za aktivno snov *klomazon* je v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo CENTIUM 36 CS se razvršča in označi kot:

Piktogrami GHS: /

Opozorilne besede:

H413

Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

Kategorija:

Kron. vod. okolje 4, H413

Dodatne informacije o nevarnosti:

Stavki o nevarnosti: /

Kategorija: /

Dodatne informacije o nevarnosti:

EUH401

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Previdnostni stavki - preprečevanje:

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Previdnostni stavki - odziv: /

Previdnostni stavki - shranjevanje:

P501

Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Dodatni stavki:

SP 1

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora

o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

VARSTVO PRI DELU: /

DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti ne izzivati bruhanja.

Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. Če je potrebno, se posvetujemo z zdravnikom.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesno veko in se oko temeljito spere s čisto vodo. V primeru draženja oči se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri vdihavanju: Ukrepa se v skladu s splošnimi ukrepi.

Nujna zdravniška pomoč: Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni.