

4. UPORABA: CHAMPION 50 WG je fungicid, ki se uporablja:

a) **v vinogradih** za zatiranje **peronospore vinske trte** (*Plasmopara viticola*) v 0,20 - 0,25 % koncentraciji (20 - 25 g na 10 l vode);

b) **v sadovnjakih** za zatiranje:

-za zatiranje **škrlupa** (*Venturia spp.*), **jablanovega raka** (*Nectria galligena*), **gnilobe koreninskega vratu** (*Phytophthora cactorum*) in **hruševega ožiga** (*Erwinia amylovora*) **na jablanah in hruškah** v 0,70 % koncentraciji (70 g na 10 L vode) za jesensko-zimska tretiranja (A-C); za tretiranja v fenološki fazi mišjega ušesa (C3) pa v 0,25 % koncentraciji (25 g na 10 L vode);

- **listne luknjičavosti koščičarjev** (*Stigmina carpophila*) v 0,5 - 1 % koncentraciji (50 - 100 g na 10 l vode) samo v času mirovanja vegetacije;

- **breskove kodravosti** (*Taphrina deformans*) v 0,50 % koncentraciji (50 g na 10 l vode) samo v času mirovanja vegetacije;

- **cvetne monilije** (*Monilinia laxa*) v 1 % koncentraciji (100 g na 10 l vode) samo v času mirovanja vegetacije;

c) **v hmeljiščih** za zatiranje **hmeljne peronospore** (*Pseudoperonospora humuli*) v 0,20 - 0,25 % koncentraciji (20 g - 25 g na 10 l vode);

d) **na vrtninah** za zatiranje:

- **čebulne plesni** (*Peronospora destructor*) v odmerku 3,5 kg / ha (35 g na 10 l vode);

- **navadne bakterijske fižolove pegavosti** (*Xanthomonas phaseoli*) v 0,5 % koncentraciji (50 g na 10 l vode);

- **kumarne plesni** (*Pseudoperonospora cubensis*) v 0,3 - 0,5 % koncentraciji (30 - 50 g na 10 l vode).

e) **na krompirju** in **paradižniku** za zatiranje **krompirjeve plesni** (*Phytophthora infestans*) in **črne listne pegavosti krompirja** (*Alternaria solani*) v odmerku 2,5 kg/ha (25 g na 10 l vode na 100 m²).

OPOZORILA: CHAMPION 50 WG se sme uporabljati na isti površini največ trikrat letno, v vinogradih pa štirikrat letno. Sredstvo je primerno zlasti za tretiranje po cvetenju vinske trte.

Pri tretiranju se mora preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in vodnih izvirov s tem, da se tretira najmanj 20 m od njih.

MEŠANJE: CHAMPION 50 WG se ne sme mešati z insekticidi kisle reakcije (diklorvos, heptenofos, dimetoat, enolsulfati), ki so v obliki koncentrata za emulzijo (EC).

FITOTOKSIČNOST: Ob uporabi v hladnem in vlažnem vremenu lahko deluje fitotoksično.

5. NEVARNOST: Sredstvo CHAMPION 50 WG se razvršča med nevarne pripravke, kot:

Xn Zdravju škodljivo.

N Okolju nevarno.

R 20 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

R 22 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

R 37 Draži dihala.

R 41 Nevarnost hudih poškodb oči.

R 43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

R51/53 Strupeno za vodne organizme; lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

S2 Hraniti izven dosega otrok.

S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

S36 Nositi primerno zaščitno obleko.

- S39 Nositi zaščito za oči in obraz.
S45 Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.
S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnosti list.

Proizvajalec je dolžan, da nevarnost sredstva vidno označi na embalaži in v navodilu.

6. KARENCA: Karenca je 14 dni za krompir, hmelj in paradižnik (na prostem in v rastlinjaku), 21 dni za vinsko trto, čebulo, kumare in fižol; za sadje je zagotovljena s časom uporabe.

MANJŠA UPORABA

Manjša uporaba se navede na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »FFS lahko uporabljajo samo poklicni pridelovalci okrasnih rastlin v zaščitenih prostorih. Učinkovitost in fitotoksičnost FFS pri uporabi na okrasnih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS.

UPORABA: CHAMPION 50 WG se lahko uporablja v zaščitenih prostorih za zatiranje **listnih pegavosti** (*Septoria* sp.) na **krizantemah in drugih okrasnih rastlinah** ter za zatiranje **gnilobe koreninskega vratu** (*Phytophthora cactorum*) **na mačehah**. Tretira se lahko največ trikrat v eni rastni dobi v koncentraciji do 0,5 % ob porabi vode do največ 1000 L/ha.

OPOZORILA: Uporabnik FFS mora med mešanjem, polnjenjem škropilnice ter pri tretiranju uporabljati zaščitno obleko, zaščitne rokavice, klobuk s širokimi kraji, trpežno obutev in zaščito za dihala (polmaska). 24 ur po tretiranju vstopanje v rastlinjak ni dovoljeno - delovna karenca za dostop v prostore, kjer je bilo opravljeno tretiranje znaša 24 ur. Pred vstopom v rastlinjak je potrebno prostor predhodno dobro prezračiti. Delavec, ki rokuje s tretiranimi rastlinami mora pri delu uporabljati zaščitne rokavice. Tretiranje naj se izvede v večernih urah, ko zračenje rastlinjaka ni potrebno več ur. Ne tretirati v bližini vzgoje sadik gojenih rastlin, ki so namenjene prehrani ljudi (sadike sadja, vrtnin in zelišč).

KARENCA: Karenca za okrasne rastline ni potrebna.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za aktivno snov *baker* za okrasne rastline ni potrebna.