

2. UPORABA:

Sredstvo CLINIC 360 SL se uporablja kot neselektivni sistemski herbicid **v nasadih agrumov (pomaranče, mandarine, limone, grenivke), pečkatega sadja (jablane, hruške), koščičastega sadja (marelice, nektarine, breskve, češnje), mandljev, v vinogradih, oljčnikih, na strniščih (pred oranjem ali setvijo) in na nekmetijskih zemljiščih**, cestah in železnicah, razen na javnih površinah, ki jih uporabljajo ranljive skupine ljudi (na primer noseče in doječe žene, dojenčki, otroci in starejši občani), kot so javni parki in vrtovi, športna igrišča, rekreacijske površine ter v neposredni bližini zdravstvenih ustanov, za zatiranje:

- a) **enoletnega plevela** v odmerku 1,5-2 L/ha (15-20 ml na 100 m²), tretira se, ko je plevel v fazi aktivne rasti največ dvakrat letno;
- b) plevelov iz rodu **slezenovcev (*Malva spp.*), kopriv (*Urtica spp.*), dresni (*Polygonum spp.*) in tolščaka (*Portulaca spp.*)** v odmerku 4-6 L/ha (40-60 ml na 100m²), tretira se, ko je plevel v fazi aktivne rasti največ dvakrat letno;
- c) **večletnega plevela** v odmerku 5-10 L/ha (50-100 ml na 100 m²), tretira se, ko je plevel tik pred cvetenjem, v fazi cvetenja ali takoj po cvetenju največ enkrat letno;
- d) **olesenelega plevela** (npr. robide (*Rubus spp.*)) na nekmetijskih površinah, ko je rastlina v fazi polne zrelosti v odmerku 5-10 L/ha največ enkrat letno na isti površini.

Priporočena poraba vode je 200-400 L/ha (2-4 L na 100 m²).

OPOZORILA: Sredstvo se ne sme uporabljati v sadovnjakih mlajših od dveh let in vinogradih mlajših od štirih let. Največja dovoljena količina letno na isti površini je 12 L sredstva na ha. Ne sme se tretirati rastlin, namenjenih za proizvodnjo semena. Ne sme se tretirati rastlin z užitnimi koreninami pred pobiranjem. Ne sme se tretirati, če se v naslednjih 6 urah pričakujejo padavine. V tretiranih oljčnikih je dovoljeno pobiranje pridelka le z drevesa in ne s tal.

Preprečiti je potrebno zanašanje sredstva na zelene in mlade dele gojenih rastlin. Ne sme se ga uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu. Sredstvo se lahko na istem zemljišču na kmetijskih in nekmetijskih površinah uporablja največ dvakrat v eni rastni sezoni. Na tretiranih zemljiščih je prepovedana paša živine za prirejo mleka, kakor tudi krmljenje s senom s tretiranih površin. Ostala živina se lahko pase in krmi s tretiranim senom 7 dni po tretiranju. Sredstva se ne sme uporabljati za desikacijo soje in krompirja. Za zatiranje plevela pred setvijo v korenovkah se ne sme uporabljati dodatnih močil.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo je fitotoksično za gojene rastline, če pride na njihove zelene dele. Preprečiti je potrebno zanašanje sredstva na zelene dele rastlin in na sosednje gojene rastline.

MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmaceutskimi sredstvi se ne priporoča.

KARENCA: Karenca za agrume, mandlje, pečkato in koščičasto sadje, trto za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter oljke je 7 dni. Karenca za strnišča je zagotovljena s časom uporabe.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za aktivno snov *glifosat* je za živila, na katerih je to sredstvo registrirano, v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo CLINIC 360 SL se **razvršča in označi** kot:

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| N | Okolju nevarno. |
| R51/53 | Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. |
| S2 | Hraniti izven dosega otrok. |
| S13 | Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. |
| S20/21 | Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. |

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S25 | Preprečiti stik z očmi. |
| S26 | Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. |
| S36/37/39 | Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. |
| S60 | Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. |
| S61 | Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. |

Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS.

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak, se jo zavaruje pred mrazom ali vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Osebi z moteno zavestjo se ne daje ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Takoj je potrebno poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

V primeru stika s kožo: Takoj je potrebno odstraniti kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in milom. Če se pojavijo znaki draženja, se pokliče zdravnika.

V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre vekci prizadetega očesa in oko temeljito spiraj s čisto vodo 15 min. V primeru draženja oči se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

V primeru zaužitja: Usta se takoj spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Takoj je potrebno poiskati zdravniško pomoč in pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

Pri vdihavanju: Ravnanje se je potrebno po splošnih ukrepih.

Navodilo zdravniku: Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatsko.