

4. UPORABA: KENYATOX VERDE se uporablja **na okrasnih in sobnih rastlinah** za zatiranje **listnih uši (Aphididae), resarjev (*Thrips* spp.), cvetličnega resarja (*Frankliniella occidentalis*) in rastlinjakovega ščitkarja (*Trialeurodes vaporariorum*)** v 0,07-0,08 % koncentraciji (7-8 ml na 10 l vode).

OPOZORILA. Sredstvo je občutljivo na svetlobo, zato ga moramo hraniti v temnih steklenicah. Pri tretiranju moramo preprečiti kontaminacijo vodotokov, jezer, vodnjakov in vodnih izvirov s tem, da tretiramo najmanj 20 m od njih.

MEŠANJE: Ne sme se mešati z bazičnimi sredstvi (bordojska brozga) in s sredstvi, ki vsebujejo večji odstotek alkohola ali glikola.

5. STRUPENOST: KENYATOX VERDE se razvršča med nevarne pripravke z oznako: Xn Zdravju škodljivo, R 36/38 Draži oči in kožo, R 65 Zdravju škodljivo: ob zaužitju lahko povzroči poškodbe pljuč. S stavki so: 2-23-46-61.

Proizvajalec je dolžan, da strupenost sredstva vidno označi na embalaži in v navodilu.