2. UPORABA:

Sredstvo DUPLOSAN KV je herbicid za zatiranje **širokolistnega plevela**, ki se uporablja:
- v ozimni ter jari pšenici in ječmenu (brez podsevkov) od fenološke faze razraščanja do kolenčenja žit (BBCH 13-31) v odmerku 2 L/ha ob uporabi 200 - 400 L vode na ha (20 ml na 2 – 4 L vode na 100 m^2).
DUPLOSAN KV dobro zatira naslednje plevele: *Capsella bursa-pastoris* - navadni plešec, *Thlaspi arvense* - njivski mošnjak, *Stellaria media* - navadna zvezdica, *Sinapis* sp. – gorjušice, *Veronica* sp. – jetičniki, *Galium aparine* - plezajoča lakota, *Raphanus raphanistrum* - njivska redkev, *Fumaria officinalis* - navadna rosnica, *Papaver rhoeas* – poljski mak, *Myosotis arvensis* – njivska spominčica, *Ranunculus arvensis* - njivska zlatica, *Stachys palustris* - močvirski čišljak, *Vicia* sp. – grašice in druge. Zadovoljivo zatira v ugodnih razmerah: *Chenopodium* sp. – metlike, *Cirsium arvense* - njivski osat, C*onvolvulus arvensis* – njivski slak, *Calystegia sepium* – navadni plotni slak, *Centaurea cyanus* - modri glavinec, *Galeopsis tetrahit* – navadna zebrat, *Mentha arvensis* – njivska meta, *Matricaria* sp. – kamilice, *Polygonum aviculare* – ptičja dresen, *Polygonum convolvulus* - navadni slakovec, *Polygonum* sp. –dresni, *Lamium amplexicaule* – njivska mrtva kopriva, *Viola arvensis* – njivska vijolica in druge.
Semenski plevel je najbolj občutljiv v obdobju bujne rasti (razvojna faza 2-6 listov), koreninski pa mora biti večji: osat naj bo visok vsaj 15 cm, ščavje pa vsaj 20 cm. Plezajoča lakota je najbolj občutljiva v razvojni fazi do razvitih 6-8 etaž, pozneje pa jo je priporočljivo zatirati z drugimi herbicidi.
- **na travnikih in pašnikih** v odmerku 3 L/ha ob (30 ml na na 100 m^2). Tretira se, ko rastline dosežejo 20-30 cm višine, tako da jih dobro poškropimo z 0,5 % raztopino sredstva Duplosan KV (50 ml sredstva v 10 L vode).
Dobro zatira naslednje plevele: *Stellaria media* - navadna zvezdica, *Calystegia sepium* – navadni plotni slak, *Cardamine* sp. – penuše, *Centaurea* sp. – glavinec, *Cirsium arvense* - njivski osat, *Plantago* sp. – trpotec, *Ranunculus* sp. – zlatica, *Taraxacum officinale* – navadni regrat, *Veratrum album* – bela čmerika, *Rumex* sp. – kislica in druge.

OPOZORILA: Sredstvo se lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škropilnice. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili. Poškodbe gojenih rastlin so možne ob prepozni uporabi sredstva v fenološki fazi od prvega kolenca do pojava zadnjega lista žit.
KARENCA: Karenca za travnike in pašnike je 28 dni, za ozimno ter jaro pšenico in ječmen je zagotovljena s časom uporabe.
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za pšenico in ječmen za aktivno snov *mekoprop-P* so v skladu s predpisi o ostankih v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo DUPLOSAN KV se razvršča in označi kot:

Xn	Zdravju škodljivo.
R22	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R38	Draži kožo.
R41	Nevarnost hudih poškodb oči.
R52/53	Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
S2	Hraniti izven dosega otrok.

S13	Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
S26	Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč
S37/39	Nositi primerno zaščito za obraz in oči.
S46	Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
S61	Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
S62	Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS.

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak, se jo zavaruje pred mrazom in se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.
V primeru stika s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom.
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči 15 min spiramo čisto vodo. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom.
V primeru zaužitja: Usta se izpere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Če oseba bruha, poskrbimo da ne aspirira izbruhane vsebine. Takoj se pokliče zdravnika ter se mu pokaže embalažo ali etiketo.
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih.
Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca in dajanje aktivnega oglja. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.

4. PROMET:

EMBALAŽA: Dajanje sredstva v promet je dovoljeno za namene, določene v tej odločbi, v originalni embalaži, s predpisano etiketo in navodilom za uporabo.
MESTO IN NAČIN PRODAJE: Fitofarmacevtsko sredstvo se sme prodajati samo v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi. Ob nakupu tega sredstva mora kupec predložiti potrdilo o znanju iz fitomedicine. Proizvajalec oziroma zastopnik na etiketi navede: »Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o znanju iz fitomedicine.«.
OBVEŠČANJE: Nosilec odločbe o registraciji mora najmanj enkrat letno obveščati naslovni upravni organ o vseh spremembah in novih spoznanjih, ki izhajajo iz fitofarmacevtskega sredstva.
VELJAVNOST REGISTRACIJE: Registracija velja **do 07.03.2018** pod pogoji, ki so določeni v izreku te odločbe in pogoji iz 23. člena ZFfS. Odprodaja in uporaba zalog fitofarmacevtskega sredstva DUPLOSAN KV, ki so opremljene s staro etiketo in so ob izdaji te odločbe še v skladiščih, na prodajnih mestih v Republiki Sloveniji ter na zalogi pri uporabnikih, se dovoli do

poteka roka uporabnosti teh zalog.