2. UPORABA

NAČIN DELOVANJA: Sredstvo UNICORN DF združuje lastnosti dveh aktivnih snovi: aktivna snov *tebukonazol* je sistemik s preventivnim in kurativnim delovanjem, *žveplo* pa deluje kontaktno in preventivno.

NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo UNICORN DF se uporablja preventivno na **trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja** za zmanjševanje okužb z **oidijem vinske trte (*Uncinula necator*)** v odmerku 2,2 kg/ha (22 g/100 m^2). S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ 2 krat v eni rastni dobi v 7 dnevnih razmikih med tretiranji. Prvo tretiranje se izvede po napovedi opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin, ko se pojavijo prvi simptomi okužb, v razvojni fazi, ko so socvetja nabrekla, cvetovi tesno stisnjeni skupaj (BBCH 55). Zadnje tretiranje se lahko izvede najpozneje v fazi, ko začno jagode zoreti (BBCH 81).
Priporočena poraba vode je 300-1200 L/ha (3-12 L/100 m^2).

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo UNICORN DF poleg *žvepla* vsebuje aktivno snov *tebukonazol*, ki glede na način delovanja pripada fungicidni skupini DMI. V praksi obstaja verjetnost razvoja odpornosti na fungicide iz skupine DMI, v kolikor jih na isti površini uporabljamo brez omejitev. Pojavu rezistence se je možno izogniti, z menjavanjem sredstev, ki imajo različne načine delovanja. Zato se sme za zatiranje oidija uporabiti fungicide iz skupine DMI fungicidov na isti površini največ dvakrat letno.
FITOTOKSIČNOST: Pri priporočeni uporabi sredstvo ne poškoduje gojenih rastlin.
KARENCA: Karenca za trto je 14 dni.
MEŠANJE: Mešanje z drugimi sredstvi za varstvo rastlin se ne priporoča.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivni snovi *tebukonazol* in *žveplo* so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo UNICORN DF se **razvršča** kot:
Razmn. 2, H361d
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410

Sredstvo UNICORN DF se **označi** kot:
Piktogrami GHS:

GHS08

GHS09

Opozorilne besede: Pozor
Stavki o nevarnosti:
H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Dodatne informacije o nevarnosti:
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Previdnostni stavki - splošno: /
Previdnostni stavki - preprečevanje:
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
P280 Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz.

Previdnostni stavki - odziv:

P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P391 Prestreči razlito tekočino.

Previdnostni stavki - shranjevanje: /

Previdnostni stavki - odstranjevanje:

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Dodatni stavki:

SP 1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
SPe 3 Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Imetnik registracije je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora imetnik registracije uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Imetnik registracije mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.
VARSTVO PRI DELU:
Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), predpasnik, zaščitne rokavice in trpežno obutev ali gumijaste škornje.
Med tretiranjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom/škropilnico ter ročno/oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so visoko nad tlemi, mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), predpasnik, zaščitne rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje in pokrivalo (kapuca ali klobuk s širokimi krajci).
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga posuši, in to samo za namen pregleda vinograda. Delo v vinogradu (npr. zelena dela) ni dovoljeno v času 7 dni po opravljenem tretiranju s sredstvom.
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.
Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. Če se pojavijo znaki draženja se pokliče zdravnika. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno obleko oprati.
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto mlačno vodo. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar, niti se mu ne izziva bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve.