2. UPORABA

NAČIN DELOVANJA: Sredstvo DOMARK 100 EC se uporablja kot sistemični triazolni fungicid s širokim spektrom delovanja. Deluje preventivno, kurativno in eradikativno.

NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo DOMARK 100 EC se uporablja na:

a) **trti za pridelavo vinskega grozdja** za zatiranje **oidija vinske trte (*Uncinula necator*)** v odmerku 0,3 L/ha ob porabi vode 1000 L/ha. Priporoča se uporaba v fenološki fazi od začetka cvetenja (BBCH 61) do začetka zorenja jagod (BBCH 81), v 10 do 14 dnevnih presledkih.
b) **jablani** za zatiranje **jablanovega škrlupa (*Venturia inaequalis*)** v odmerku 0,4 L/ha ob porabi vode 1000 L/ha. Priporoča se uporaba v fenološki fazi od konca cvetenja (BBCH 69) do faze, ko plodovi dosežejo polovico končne velikosti (BBCH 75), v 7 do 14 dnevnih presledkih.

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Aktivna snov *tetrakonazol* pripada fungicidni skupini DMI. Zaradi možnosti nastanka navzkrižne rezistence med fungicidi, ki pripadajo omenjeni skupini, se sme sredstvo DOMARK 100 EC in druga sredstva z enakim načinom delovanja uporabiti v istem vinogradu ali nasadu jablan največ dvakrat v eni rastni sezoni.
KARENCA: 30 dni za vinsko grozdje, 14 dni za jabolka.
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodilom za uporabo.
MEŠANJE: Sredstvo se meša z večino sredstev, ki se uporabljajo v času njegove optimalne uporabe, kot so sredstva iz skupin *ditiokarbamatov, ftalimidov, bakrovih spojin, žveplovih spojin, triazolov, acilalaninov* in *fenilamidov, oksazolov, strobilurinov, spiroksaminov, organskih fosfornih estrov*, inhibitorjev in regulatorjev razvoja žuželk. Pri pripravi škropilne brozge je treba upoštevati načela dobre agronomske prakse.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo DOMARK 100 EC se **razvršča** kot:
Akut. strup. zauž. 4, H302
Strup. vdih. 1, H304
Draž. kože 2, H315
Poškod. oči 1, H318
STOT SE 3, H336
Akut. in kron. vod.ok.2, H411

Sredstvo DOMARK 100 EC se **označi** kot:
Piktogrami GHS:

GHS05

GHS07

GHS08

GHS09

Opozorilna beseda: Nevarno
Stavki o nevarnosti:

H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304	Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315	Povzroča draženje kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Dodatne informacije o nevarnosti:

EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Previdnostni stavki - preprečevanje:

P261 Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P280 Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz.

Previdnostni stavki - odziv:

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P331 NE izzvati bruhanja.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P391 Prestreči razlito tekočino.

Previdnostni stavki - shranjevanje:

P405 Hraniti zaklenjeno.

Previdnostni stavki - odstranjevanje:

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Dodatni stavki:

SP 1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

SPe 3 Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju <u>jablan</u> upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.
Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju <u>trte za pridelavo vinskega grozdja</u> upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju ali čiščenju rezervoarja ter med tretiranjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon, predpasnik), zaščitne (nitrilne) rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje, ščitnik za obraz in tesno prilegajoča zaščitna očala.
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in zaščitne rokavice.
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:
<u>Splošni ukrepi:</u> Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.
<u>Pri vdihavanju:</u> Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.

Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečencu se ne daje piti ničesar. Takoj se pokliče zdravnika. NE IZZIVA SE BRUHANJA! V primeru spontanega bruhanja mora biti glava ponesrečene osebe nižje od bokov, da se prepreči aspiracija. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva.
Stik s kožo: Kožo se izpira z obilico čiste vode 15 minut ali več. Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. **Pozor:** Uporabi se zaščitne rokavice; paziti je treba, da se ne kontaminira še nepoškodovanih delov kože in oči. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno obleko oprati.
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito s počasnim curkom spere s čisto mlačno vodo. Curek se usmeri v notranji kot očesne reže (ne na zrklo), pri poškodbah obeh očes pa na koren nosu. Oči se izpira 20 min in več. Nato se takoj poiščemo pomoč pri zdravniku ali okulistu.
Medicinski ukrepi: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).